


Byfavo tjekliste (medbring på stuen)

	Bland Byfavo og optræk Rapifen 1 mg.
	Medbring antidoter; Naloxon og Flumazenil
	Er der givet opioid forud for procedure?
	Vurdering af ASA score
	Luftvejsvurdering: Nakke, underbid, overvægt, løse tænder
	Påsæt monitorering: SpO ₂ – BT - EKG
	Giv O ₂ ; 3 L/min på næse-ilt brille
	Tjek udstyr: sug og ventilationsmaske
	Alle på stuen til proceduren?
	Sedering startes
	Er der behov for Rapifen 0,5 mg? – 1-2 min. til Rapifen indsættelse
	Dokumentéret i Journal?
	Indtastet i RedCap?

a-gruppe	Definition	Eksempler ved voksne	Eksempler ved børn
ASA 1	Rask patient	Rask, ikke ryger, intet eller minimalt alkoholforbrug ¹	Rask uden akut eller kronisk sygdom. Følger højde- og vægtkurver
ASA 2	Mild systemisk sygdom	Ingen funtionsbegrænsning. Ryger, alkoholindtag i social sammenhæng, gravid, svær fedme (30<BMI<40), velbehandlet DM, HA, mild lungesygdom.	Asymptomatisk medfødt hjertesygdom, velkontrollerede rytmeforstyrrelser, astma uden eksacerbation, velkontrolleret epilepsi, ikke insulin-afhængig DM. Følger ikke højde- og vægt kurver.
ASA 3	Alvorlig systemisk sygdom	Afgrænset funktionsnedsættelse. Dysreguleret DM, HA, KOL, ekstrem fedme (BMI≥40), aktiv hepatitis, alkoholafhængighed eller misbrug, pacemaker, moderat nedsat EF, ESRD, kronisk dialyse, AMI, PCI-behandling, apopleksi, TCI eller trombolyse af cerebrale kar for mere end 3 måneder siden.	Ikke behandlet stabil medfødt hjertesygdom, astma med eksacerbation, dysreguleret epilepsi, insulinafhængig DM, ekstrem fedme, underernæret, svær OSA, kræft, nyresvigt, muskeldystrofi, cystisk fibrose, organtransplanteret, hjerne-/rygmarvsmisdannelse, symptomatisk hydrocephalus, autisme med alvorlige begrænsninger, stofskiftesygdom, vanskelig luftvej, langvarig parenteral ernæring.
ASA 4	Alvorlig systemisk sygdom som er konstant livstruende	AMI, PCI-behandling, apopleksi, TCI eller trombolyse af cerebrale kar for mindre end 3 måneder siden, symptomatisk iskæmisk hjertesygdom eller svær klapdysfunktion, svært nedsat EF, shock, sepsis med tegn til påvirket organfunktion, DIC, ARDS eller kontinuerlig dialyse.	Symptomatisk medfødt hjertesygdom, kongestiv hjereteinsufficiens, sequelae fra præmaturitet, akut hypoxisk-iskæmisk encefalopati, shock, sepsis, DIC, ICD, afhængig af ventilation, endokrinopati, alvorligt traume, svær respiratorisk stres, fremskreden kræft.
ASA 5	Moribund patient,	Bristet abdominalt eller thorakalt aortaaneurisme, svære traumer, intrakranielt blødning med massevirkning, tarmiskæmi ved hjerte- eller multiorgansvigt.	

Byfavoblanding: 20 mg ampul: 8,2 mL NaCl blandes i ampul → 2,5mg/ml Byfavo
50 mg ampul: 20,8 mL NaCl blandes i ampul → 2,5mg/ml Byfavo

Forberedelsne



Sedationen (version 1 og version 2)

