

Analyse af gener relevante ved mistanke om familiære interstitielle lungesygdomme

Panelbeskrivelse

Navn: Analyse af gener relevante ved mistanke om familiære interstitielle lungesygdomme

Antal gener: 38

version: 1.0

Ibrugtagningsdato: 2025-10-10

Metodebeskrivelse: Prøveforberedelse og sekventering: Der udføres helgenomsekventering (WGS) med Illumina PCR free library prep (tagmentation) og Illumina sekventering (NovaSeq). Middelsekventeringsdybden for analysen er minimum 30X og minimumsandelen af genomet, der er dækket minimum 15X, er 95 %. Middelsekventeringsdybden og andelen, der i gennemsnit er dækket minimum 15X, for de enkelte gener kan ses i nedenstående tabel.

Dataanalyse: Referencegenom: hg38. Alignment og variantkald foretages med hhv. BWA og GATK. Data analyseres for strukturelle varianter vha. Manta og GATK-gCNV. Der foretages *in silico* filtrering af data til relevante genregioner baseret på nedenstående tabel. Varianter med allelfrekvens mindre end 15% filtreres som udgangspunkt fra. For alle, eller de specifikt anførte, gener undersøges der for varianter i de proteinkodende regioner og de nærmeste 10 bp i de tilstødende ikke-proteinkodende regioner, mtDNA, samt varianter i ikke-proteinkodende regioner indberettet som sandsynlig patogene (C4) eller patogene (C5) i ClinVar. Varianter klassificeres iht. ACMGs klassifikationsguideline (PMID: 25741868), og hvis tilgængelig og relevant benyttes ClinGens genspecifikke guideline. Varianter af ukendt klinisk betydning (C3) anføres kun i svaret, hvis de vurderes relevante i forhold til sygdomsbilledet. Anlægsbærerstatus for recessiv sygdom rapporteres ikke nødvendigvis. Genomsekventering er en screeningsmetode, og ikke alle varianter kan med sikkerhed identificeres. Den udførte analyse har ikke samme sensitivitet som DNA-microarrayanalyse ift. strukturelle varianter.

Genliste

Gener, hvor middelsekventeringsdybden er < 30X, er markeret med¹. Gener, hvor andelen af de kodede regioner, der dækket minimum 15X, er < 95 % er markeret med². Gener, der derudover vides at være suboptimalt dækket, er markeret med³. Værdier er angivet med +/- standardafvigelse.

Gen	Middelsekventeringsdybde [x]	Andel >= 15x [%]	Andel >= 20x [%]	Andel >= 30x [%]
<i>ABCA3</i>	51.98 +/- 8.4	100.0 +/- 0.0	99.91 +/- 0.48	97.97 +/- 6.15
<i>ACD</i>	47.59 +/- 8.19	100.0 +/- 0.0	99.87 +/- 0.64	96.66 +/- 8.72
<i>AP3B1</i>	55.41 +/- 7.43	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.03	99.47 +/- 1.56
<i>ASAH1</i>	55.58 +/- 7.86	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.73 +/- 0.81
<i>CASR</i>	51.5 +/- 7.85	99.99 +/- 0.09	99.66 +/- 0.5	97.56 +/- 3.22
<i>CSF2RA</i>	53.64 +/- 7.56	100.0 +/- 0.0	99.96 +/- 0.25	99.14 +/- 2.59
<i>CSF2RB</i>	51.16 +/- 7.93	100.0 +/- 0.0	99.97 +/- 0.22	97.92 +/- 6.99
<i>CTC1</i>	50.95 +/- 7.99	100.0 +/- 0.0	99.94 +/- 0.24	98.52 +/- 4.55
<i>DKC1</i>	42.52 +/- 16.09	99.94 +/- 0.32	93.3 +/- 13.12	69.97 +/- 35.49
<i>FAM111B</i>	54.95 +/- 7.9	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.7 +/- 0.71
<i>FARSA</i>	52.15 +/- 8.09	100.0 +/- 0.0	99.9 +/- 0.7	98.75 +/- 4.9
<i>FARSB</i>	54.99 +/- 7.61	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.58 +/- 0.95
<i>GBA1</i> ^{2,3}	39.15 +/- 6.24	82.96 +/- 3.33	74.54 +/- 2.97	70.82 +/- 3.62
<i>HPS1</i>	52.53 +/- 8.78	100.0 +/- 0.0	99.95 +/- 0.34	98.62 +/- 4.65
<i>HPS4</i>	53.6 +/- 8.12	99.96 +/- 0.06	99.86 +/- 0.13	98.79 +/- 3.14
<i>ITGA3</i>	49.19 +/- 8.16	100.0 +/- 0.0	99.96 +/- 0.24	97.22 +/- 6.6
<i>NAF1</i>	49.17 +/- 6.93	100.0 +/- 0.0	99.23 +/- 1.21	95.77 +/- 4.7
<i>NHP2</i>	52.6 +/- 7.71	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	98.95 +/- 3.65
<i>NKX2-1</i>	51.81 +/- 7.67	99.99 +/- 0.04	99.97 +/- 0.07	98.01 +/- 5.4
<i>NOP10</i>	51.39 +/- 8.82	100.0 +/- 0.0	99.97 +/- 0.18	99.74 +/- 0.75

Gen	Middelsekventeringsdybde [x]	Andel >= 15x [%]	Andel >= 20x [%]	Andel >= 30x [%]
PARN	55.23 +/- 7.78	100.0 +/- 0.0	99.94 +/- 0.37	99.31 +/- 2.15
POT1	55.53 +/- 7.57	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.01	99.62 +/- 1.32
RPA1	54.52 +/- 7.74	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.38 +/- 1.71
RTEL1	52.84 +/- 8.99	100.0 +/- 0.0	99.99 +/- 0.07	98.89 +/- 3.71
SFTPA1	50.33 +/- 8.36	99.66 +/- 0.47	98.5 +/- 1.81	95.59 +/- 4.76
SFTPA2	53.0 +/- 7.86	100.0 +/- 0.0	99.99 +/- 0.07	98.32 +/- 5.1
SFTPB	50.07 +/- 8.62	100.0 +/- 0.0	99.96 +/- 0.17	97.73 +/- 5.0
SFTPC	51.46 +/- 8.72	100.0 +/- 0.0	99.99 +/- 0.06	99.04 +/- 3.84
SLC34A2	51.5 +/- 7.82	100.0 +/- 0.0	99.99 +/- 0.04	98.82 +/- 3.85
SLC7A7	52.7 +/- 8.37	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.13 +/- 2.96
SMPD1	51.77 +/- 8.45	99.99 +/- 0.05	99.6 +/- 2.02	97.14 +/- 8.99
STING1	48.77 +/- 8.7	100.0 +/- 0.0	99.9 +/- 0.66	97.32 +/- 6.84
STN1	54.12 +/- 8.47	100.0 +/- 0.0	99.99 +/- 0.04	99.28 +/- 2.46
TERC	59.62 +/- 11.41	100.0 +/- 0.0	99.75 +/- 1.65	98.95 +/- 5.25
TERT	57.28 +/- 9.3	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.04 +/- 2.76
TINF2	51.29 +/- 8.06	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.01	97.99 +/- 6.43
WRAP53	49.42 +/- 8.84	100.0 +/- 0.0	99.84 +/- 1.09	97.08 +/- 7.35
ZCCHC8	53.67 +/- 7.45	100.0 +/- 0.0	99.93 +/- 0.49	99.16 +/- 2.38

For supplerende oplysninger vedrørende analysen kan afdelingen kontaktes på mail: mol-dia@rn.dk. Rapport genereret: 23/01-2026