



Tilpasning af referenceintervallet for P-Basisk fosfatase

Fra og med torsdag den 4. april 2024 justeres referenceintervallet for P-Basisk fosfatase ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, på alle matrikler.

Ændring

Referenceintervallet for P-Basisk fosfatase hos voksne (18 år-) justeres for prøver analyseret ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, på Aalborg, Thisted og Hobro matriklen:

Nye referenceinterval	40-120 U/L
Hidtidige referenceinterval	35-105 U/L

Referenceintervallet er forsat ens for kvinder og mænd, og børnerferenceintervallet er uændret. Resultaterne vil fremkomme på samme linje som hidtil i NordEPJ, og resultatet vil være ledsaget af det specifikt anvendte referenceinterval på datoen for prøvetagning.

Baggrund

Efter overgang til ny metode for måling af P-Basisk fosfatase har der på baggrund af løbende niveauovervågning vist sig et behov for at justere referenceintervallet grundet et ikke ubetydeligt antal patienter med resultat lige over det hidtidige referenceinterval. Det nye referenceinterval er lokalt etableret på baggrund af 120 bloddonorer og er i overensstemmelse med litteraturen samt den forventede niveau-forskel mellem metoderne.

Referenceintervallet er indtil videre uændret ved de øvrige kliniske biokemiske afdelinger i Region Nordjylland og Midtjylland, men der vil blive set på mulighederne for fremtidig harmonisering.

Nærmere information

For nærmere information, se www.laboratorievejledning.rn.dk eller kontakt gerne undertegnede.

Med venlig hilsen

Ida Marie Nørum Wigh
Læge i introduktionsstilling
i.wigh@rn.dk
Klinisk Biokemisk Afdeling,
Aalborg Universitetshospital

Stine Linding Andersen
Konstitueret cheflæge, ph.d., dr. med.
stine.a@rn.dk
Klinisk Biokemisk Afdeling,
Aalborg Universitetshospital