



Operation for blindtarmsbetændelse (voksne)

Du er indlagt på AMA-A med blindtarmsbetændelse eller mistanke om blindtarmsbetændelse og afventer operation.

AMA-A er et akut modtageafsnit. Derfor kan vi ikke sige, hvornår du bliver kørt til operation. Du kan opleve lang ventetid, og operationen kan blive udsat. Vi vil så vidt muligt holde dig løbende orienteret herom.

Sådan behandles blindtarmsbetændelse

Blindtarmsbetændelse er en pludselig betændelsestilstand i et lille stykke tarm, der sidder på starten af tyktarmen. Når der går betændelse i blindtarmen, skal den fjernes, så tilstanden ikke forværres. Blindtarmen fjernes ved en kikkertoperation.

Sådan foregår operationen

Under operationen er du fuldt bedøvet.

Inden du bliver bedøvet, får du lagt et drop, som du får væske og medicin igennem. Kirurgen, der skal operere dig, taler først med dig om, hvad der skal foregå, og herefter bliver du bedøvet.

Operationen udføres med kikkert gennem 3 små huller i bugvæggen. Du får blæst luft ind i bughulen, hvorefter kirurgen fører 3 små rør ind. Gennem disse rør indføres kikkerten og de øvrige instrumenter, kirurgen skal bruge til at fjerne blindtarmen.

Operationen varer cirka 1-2 timer.

Sådan forbereder du dig

Vær fastende

Du skal være fastende til operation, det vil sige, at du ikke må spise, drikke, ryge eller tygge tyggegummi. Derfor vil du opleve, at vi holder dig fastende fra midnat.

Er du i tvivl, så kontakt os. Det er vigtigt for din sikkerhed under bedøvelsen, at du følger reglerne. Du kan se en video om fastereglene her:

[Tekst]