



Sådan tager du en afføringsprøve til måling af calprotectin

Du skal tage en afføringsprøve, så vi kan undersøge indholdet af calprotectin i din afføring.

Calprotectin er et protein, som findes i blod, urin og afføring hos alle mennesker. Ved inflammatoriske tarmsygdomme (kronisk betændelsestilstand i tarmen) stiger indholdet af calprotectin kraftigt i afføringen. Undersøgelse af calprotectin kan anvendes til udredning af diarré, og om der er aktivitet i en inflammatorisk tarmsygdom.

Prøvesættet indeholder:

- 1 stykke afdækningspapir til toiletet.
- 1 rør til forsendelse af afføring.
- 1 følgeseddel.
- 1 kuvert som bruges til at sende prøven til Klinisk Biokemisk Afsnit.

Sådan gør du

Sådan udfører du prøvetagningen og sender afføringsprøven

- Start med at lade vandet, så der ikke bliver blandet urin i prøven.
- Følg vejledningen og tegningen på papirstrimlen, og klæb papirstrimlen til opsamling fast på toiletsædet.
- Når du er klar, skal du skrue det brune låg af røret og udtage en klump afføring med spartlen. Klumpen skal være på størrelse med en hasselnød. Skru herefter låg med spartel fast igen.
- Mærk glasset med prøvenummeret fra følgesedlen.
- Sæt røret i det grå forsendeshylster, og skru låget godt fast.
- Noter dato på følgesedlen.
- Indsend prøven til Klinisk Biokemisk Afsnit sammen med følgesedlen inden for et døgn. Brug den medfølgende kuvert. Prøven skal sendes enten mandag, tirsdag eller onsdag.

