



Undersøgelse af spytkirtlerne

Du skal have foretaget en undersøgelse af spytkirtlerne, en såkaldt spytkirtel-skintigrafi.

Undersøgelsen viser, hvordan dine spytkirtler fungerer, og om spytkirtlernes åbning er tilstoppet.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Du skal ligge på et smalt leje med en skanner på hver side af dit hoved. Skannerne er helt tæt på dig, dog uden at røre dig.

Du får sprøjtet en lille mængde radioaktivt sporstof ind i en blodåre i armen. Stikket fra indsprøjtningen kan sammenlignes med at få taget en blodprøve. Det radioaktive stof transporteres med blodet ned til dine spytkirtler. Derefter skal du ligge helt stille, mens vi skanner spytkirtlerne.

Der er ingen bivirkninger i forbindelse med indsprøjtningen af det radioaktive stof. Der er personale til stede hos dig under hele skanningen.

Efter 20 minutter får du sprøjtet lidt citronsaft ind i munden, så vi kan se, om spytkirtlerne afgiver spyt i munden som reaktion på syren i citronen.

Undersøgelsen varer cirka 1 time i alt.



SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er gravid eller ammer, skal du kontakte os inden undersøgelsen, da dette kan have indflydelse på gennemførelsen af undersøgelsen.

NÅR DU KOMMER HJEM

Vi afsender svaret herfra inden for 5 hverdage. Du får svar på undersøgelsen af den afdeling eller den læge, som har henvist dig.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Nuklearmedicinsk Afdeling
Tlf. 97 66 55 00

Vi træffes bedst:
Mandag – torsdag 7.30 – 15.00
Fredag 7.30 – 14.30