


Undersøgelse af knoglerne

Knogleskintigrafi hos børn (0-5 år)

Du skal have undersøgt dine knogler. Det gør vi ved at tage billeder af dine knogler med en særlig maskine, så lægen kan se på billederne.



På billedet kan lægen se, hvordan Tobis knogler ser ud.



Ligesom Tobi får du sprøjtet lidt sporstof ind i en blodåre. Sporstoffet suser ind i kroppen og leder efter dine knogler.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Du skal møde på Børneafdelingen

Du skal møde på Børneafdelingen. Der giver vi dig et stik i armen, hvor vi lægger et tyndt plastikrør ind i en blodåre. Herefter skal du videre til Nuklearmedicinsk Afdeling.

Du skal have en indsprøjtning

Når du kommer ind på Nuklearmedicinsk Afdeling, får du indsprøjtet en lille mængde radioaktivt sporstof i en blodåre. Sporstoffet løber ind i kroppen og finder dine knogler. Så kan vi se dem på billedet. Du skal vente i cirka 2 timer, fra sporstoffet er sprøjtet ind, og til vi kan undersøge dig.

Drik en masse, mens du venter

I ventetiden behøver du ikke være på sygehuset, men du skal drikke så meget, du kan. Det skal du, for at sporstoffet kan få hjælp til at flyde rundt i kroppen, og for at det kan blive vasket ud igen bagefter. Du må gerne tisse i ventetiden.

Forbered dig på at ligge stille

Efter cirka 2 timer skal du ind til undersøgelse. Sørg for at tisse lige inden, da det er vigtigt, at din blære er tømt, da du skal ligge stille i 15-45 minutter.

I alt varer undersøgelsen 3-4 timer.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Mød fastende til undersøgelsen

Vi anbefaler, at du møder fastende til undersøgelsen, for hvis det er svært at lægge det tynde plastikrør ind i din blodåre, har vi mulighed for at give dig lidt

sovegas, så du ikke mærker noget. Det kan vi ikke, hvis du har spist.

Børn under 6 måneder:

- Du må ikke få mælk 4 timer inden aftalen.
- Du må få tynde væsker, det vil sige vand, juice eller saft, indtil 2 timer før.

Børn over 6 måneder:

- Du må ikke få mælk og fast føde 6 timer inden aftalen.
- Du må få tynde væsker, det vil sige vand, juice eller saft, indtil 2 timer før.

Smør tryllecreme på armen hjemmefra

Du skal have et stik i armen. For at det ikke skal gøre ondt, kan du smøre tryllecreme (emla) på stedet, hvor vi skal stikke. Så kan du næsten ikke mærke det. Vi stikker der, hvor dine årer er tydelige, som regel i albuebøjningen. Du må gerne bruge tryllecreme mere end et sted. Smør med cremen 1 time inden du skal møde.

Tag underholdning med

I den time, du har, hvor du kun skal tænke på at drikke væske, kan det være rart med lidt underholdning. Tag gerne noget med hjemmefra, fx en iPad, en bog eller et spil.

Drik godt med væske før og efter undersøgelsen

Du skal drikke godt med væske i døgnnet før undersøgelsen og efter undersøgelsen. Det hjælper dig med at få sporstoffet hurtigt ud af kroppen igen.



Tobis knogler bliver undersøgt i maskinen, mens han ligger helt stille. Tobi leger, at han er en burgerbolle, der skal en tur i brødristeren. Det gør ikke ondt at ligge i maskinen.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Du får svar på undersøgelsen af den læge eller den afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Nuklearmedicinsk Afdeling
Tlf. 97 66 55 00

Vi træffes bedst:
Mandag – torsdag 7.00 – 15.00
Fredag 7.00 – 14.30