

Undersøgelse af hudens gennemblødning

Du skal have foretaget en undersøgelse af hudens gennemblødning, en såkaldt hud-perfusionstest. Undersøgelsen viser, om blodforsyningen i huden er normal.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Du får målt blodtryk på armene

Undersøgelsen starter med, at vi måler blodtryk på begge dine arme. Hvis du kommer hjemmefra, skal du hvile på ryggen på et lege i 15 minutter inden dette.

Du får målt blodtryk på benene

En blodtryksmanchet lægges omkring det eller de ben, der skal måles på, og en sensor sættes på de steder, hvor trykket skal måles.

Manchetten bliver pumpet op med luft, og luften lukkes langsomt ud igen, mens sensoren opsamler data. På den måde kan sensoren registrere, ved hvilket tryk der er blodgennemstrømning. Målingerne kan gøre ondt på grund af manchettens tryk på benet. Målingerne gentages, indtil der er minimum 2 målinger, der ikke afviger betydeligt fra hinanden.

Du får målt hud-perfusionstryk på benene

Herefter sættes en anden type sensor ind under blodtryksmanchetten, og målingerne gentages. Denne måling viser, ved hvilket tryk huden fyldes med blod.

Det er nødvendigt, at du ligger helt stille og er afslappet under målingerne. Undersøgelsen varer ½-1 time.



SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Kontakt din læge, hvis du har smerter

Hvis du har smerter, anbefaler vi, at du får noget smertestillende medicin forud for undersøgelsen. Hvis du har brug for smertestillende medicin, skal du derfor kontakte din læge eller den læge, der har henvist dig.

NÅR DU KOMMER HJEM

Du får svar på undersøgelsen

Du får svar på undersøgelsen af den afdeling eller den læge, som har henvist dig. Vi afsender svaret herfra inden for 5 hverdage.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Nuklearmedicinsk Afdeling

Tlf. 97 66 55 00

Vi træffes bedst:

Mandag – torsdag 7.30 – 15.00

Fredag 7.30 – 14.30