



MR-skanning af prostata

Du skal have foretaget en MR-skanning. MR betyder magnetisk resonans. Skanningen foregår ved, at radiobølger og en antenne opfanger et signal, som bliver omdannet til et billede i en computer. På den måde gør skanningen det muligt at undersøge dele af kroppen som fx hjerne, knogler, brusk, ledbånd, muskler og blodårer.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

For at få et så godt resultat af undersøgelsen som muligt starter vi med at lægge et tyndt kateter (plastikrør) ind i din endetarm. Målet med dette er at mindske mængden af luft, der står i endetarmen, da luften kan forstyrre billederne. Kateteret bliver påsmurt glidecreme for at mindske ubehag. Kateteret skal kun ligge ganske kortvarigt og fjernes igen, inden skanningen går i gang.

Dernæst skal du ligge på et leje, som bliver ført ind i en rørformet magnet. Magneten er 55 cm i diameter, og den er oplyst og TV-overvåget. Du har mulighed for at kontakte personalet under hele skanningen.

Skanningen varer ½ - 2 timer. Under skanningen vil der være en række bankelyde i perioder af 1-15 minutter.

For at undersøgelsen bliver optimal, er det vigtigt, at du ligger helt stille under hele skanningen.

Du får udleveret ørepropper

MR-skanningen er forbundet med et højt støjniveau, og derfor får du udleveret høreværn eller ørepropper.

Hvis du skal have kontraststof

Lægen vurderer, om du skal have kontraststof i forbindelse med skanningen. Hvis det er tilfældet, får du anlagt en nål i en blodåre. Du får kontraststof igennem nålen. Kontraststoffet hjælper lægerne med at tolke skanningsbillederne. Nålen fjernes efter undersøgelsen.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Bestil tid til en blodprøve inden undersøgelsen

Du skal få taget en blodprøve (plasmakreatinin) inden undersøgelsen. Prøven skal **tages tidligst 1 måned før undersøgelsestidspunktet**.

Du kan få taget blodprøven hos din egen læge eller på et hospital. Vil du have taget prøven på et hospital i Region Nordjylland, skal du bestille tid på www.booking.rn.dk. Du skal bruge MitID for at bestille.

Kontakt din læge, hvis du skal bruge medicin inden undersøgelsen

Har du problemer med at ligge stille på grund af smerter, eller har du tendens til klaustrofobi, så kontakt på forhånd din egen læge eller den læge, der har henvist dig, for at få smertestillende eller beroligende medicin.

Tag din sædvanlige medicin

Får du medicin, så tag samme dosis, som du plejer, inden du møder hos os, **medmindre** du har fået andet at vide.

Undlad smykker, piercinger og make-up

Før undersøgelsen – og allerhelst hjemmefra – skal du fjerne alle metalgenstande såsom smykker, piercinger, hårnåle, hårspænder og ur. Der må heller ikke være metal, fx pailletter eller nitter, på dit tøj. Undlad også make-up, da make-up kan indeholde rester af metal. Hjælpemidler af metal, fx briller eller høreapparat, behøver du først tage af umiddelbart før selve undersøgelsen.

NÅR DU KOMMER HJEM

Hvis du har fået kontraststof

Kontraststoffet er udskilt via urinen efter 24 timer, og det er ikke noget, du kan hverken se eller mærke.



Du får svar på undersøgelsen

Du får svaret på undersøgelsen fra den læge eller afdeling, som har henvist dig.

MULIGE RISICI

Der er risici forbundet med kontraststof. Lige efter at kontraststoffet er givet, kan du føle lidt varme. Der kan desuden forekomme kvalme, opkastning, hovedpine og allergiske reaktioner. Svære bivirkninger ses meget sjældent. Du kan eventuelt læse mere på patienthaendbogen.dk. Søg på 'kontrast og MR-skanning'.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Urologisk Afdeling

Tlf. 97 66 09 44

Mandag – fredag kl. 08.30 – 13.00

Træffes bedst mellem kl. 09.00 – 12.00