

CT-skanning

Du skal have foretaget en CT-skanning. En CT-skanning er en computerstyret røntgenfotografering, som laver billeder i "tværsnit" af et område af din krop. Alle dele af kroppen kan skannes, fx hjernen, brystkassen, maven og knoglerne. Skanningen viser et tydeligt billede af de organer, der skannes, og giver mulighed for at se mere detaljerede strukturer i forhold til almindelige røntgenbilleder.

Undersøgelsen foregår i fuld narkose.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Ring til Anæstesi Nord, hvis du har været forkølet

Hvis du har været forkølet eller haft feber inden for de seneste 2 uger, skal du kontakte Anæstesi Nord, så en læge kan vurdere, om du er rask nok til at blive bedøvet.

Bestil tid til en blodprøve inden undersøgelsen

Da du skal have kontrastvæske under din skanning, har vi brug for at vide, om dine nyrer fungerer, som de skal, og kan udskille kontrastvæsken efter skanningen. Det undersøger vi ved hjælp af en blodprøve, der måler dit P-kreatinin.

Du skal derfor bestille tid til en blodprøve. Prøven skal tages 1-6 dage inden undersøgelsen. Du kan få taget prøven hos din egen læge eller på et hospital. Vær opmærksom på, at prøven ikke må være mere end 7 dage gammel på undersøgelsestidspunktet, så vi så ikke kan bruge prøvens resultat.

Drik rigeligt dagen før undersøgelsen

Dagen før undersøgelsen skal du drikke rigeligt med væske. Det kan fx være vand, saftvand eller juice uden frugtkød. Når din krop får væske nok, kan nyrerne hurtigere udskille kontrastvæsken efter undersøgelsen.

Tag din sædvanlige medicin

Får du medicin, så tag samme dosis, som du plejer, inden du møder hos os. Medicinen har ikke indflydelse på undersøgelsen.

Mød fastende til undersøgelsen

Du skal faste inden narkosen, så din mavesæk er helt tom. Møder du ikke fastende, kan vi være nødt til at aflyse den planlagte undersøgelse. Følg disse fasteregler:

For børn under 3 år:

- Du må spise og drikke normalt indtil 6 timer før undersøgelsen.
- Du må få modermælk indtil 4 timer før.
- Du må få modermælkserstatning indtil 6 timer før.
- Du må drikke klare væsker, det vil sige vand, juice uden frugtkød eller saft, indtil 2 timer før.

For børn over 3 år:

- Du må spise og drikke normalt indtil 6 timer før undersøgelsen.
- Du må drikke klare væsker, det vil sige vand, juice uden frugtkød eller saft, indtil 2 timer før.

For dit velbefindende før og efter narkosen anbefaler vi, at du drikker et glas sukkerholdig saft 2 timer før den planlagte undersøgelse og derefter ingenting, til narkosen er overstået.

Følg disse retningslinjer, medmindre narkoselægen har givet dig anden vejledning.

Brug eventuelt lokalbedøvende plaster

Hvis du er over 6 år, vil du have glæde af lokalbedøvende plastre, så huden er bedøvet, når vi lægger en plastikkanyle i en blodåre. Du skal selv købe plasteret på apoteket forud for skanningen. Plasteret hedder enten Emlaplast eller Tapinplaster og kan købes i håndkøb. Se vejledningen i vedlagte husk-bilag.



SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Modtagelse

I møder på Anæstesi Nord. Herfra bliver I fulgt over til skanneren. Her tager personalet fra Anæstesi-afdelingen imod jer.

Bedøvelse

For at undersøgelsen bliver optimal, er det vigtigt, at du ligger helt stille under hele skanningen. Det kan være svært, og derfor skal du i narkose.

Du bliver enten bedøvet med maske eller med en indsprøjtning i en blodåre.

Se den vedlagte pjece 'Når dit barn skal bedøves til CT- eller MR-skanning' for at sikre, at du møder forberedt til undersøgelsen.

Overvågning

Vi overvåger dig konstant under undersøgelsen, blandt andet ved at måle din vejrtrækning og dit kredsløb, og vi kan øjeblikkeligt gribe ind, hvis der skulle blive behov for det.

Selve undersøgelsen

Du ligger på ryggen på et leje, som bevæger sig igennem CT-skanneren. Imens tager skanneren billeder fra forskellige vinkler med få millimeters afstand. Åbningen i skanneren er cirka 70 cm i diameter og ½-1 meter dyb. Skanneren er åben i begge ender.

Du får lagt en nål i en blodåre. Du får kontraststof igennem nålen. Kontraststoffet hjælper lægerne med at tolke skanningsbillederne. Du vil mærke, at kontrasten løber ind, men det må ikke gøre ondt. Ved smerter skal du give besked til personalet. Vi fjerner nålen igen efter undersøgelsen.

Undersøgelsen varer 30 minutter, inklusiv den tid det tager at bedøve dig. Tiden kan dog variere meget, uden at det bør give anledning til bekymring.

Forældre

Dine forældre må være hos dig, indtil du sover, og igen på opvågningsstuen, når du vågner efter undersøgelsen. Imens du bliver undersøgt, kan de opholde sig på Anæstesi Nord eller eventuelt på ventegangen på Radiologisk Afdeling.

Vær opmærksom på, at søskende ikke er velkomne på undersøgelsesdagen.

EFTER UNDERSØGELSEN

Efter undersøgelsen bliver du kørt på en opvågningsstue, hvor du skal være, indtil du kan drikke og eventuelt spise uden at kaste op. Efter cirka 2 timer kan du tage hjem.

Hvis I selv skal køre hjem, skal der være 2 voksne sammen med dig. Den ene skal køre bilen, og den anden skal være hos dig, fordi du muligvis kaster op efter bedøvelsen.

NÅR DU KOMMER HJEM

Søg læge ved smerte eller føleforstyrrelser

Der kan forekomme udsivning af kontrastvæske under huden. Dette er en generende, men ufarlig og forbigående tilstand. I sjældne tilfælde kan der opstå forværring af smerten eller føleforstyrrelser. Sker dette, skal du søge lægehjælp.

Du kan få allergi-lignende symptomer

Hvis du er i behandling med Interleukin-2, kan du få allergi-lignende symptomer – typisk udslæt – i op til 2 uger, efter du har fået kontraststoffet. Sker det, skal du kontakte din læge.

Du får svar på undersøgelsen

Du får svar på undersøgelsen fra den læge eller afdeling, som har henvist dig.



AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL
– i gode hænder

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Radiologisk Afdeling

Tlf. 97 66 56 45

Telefontid:

Mandag – torsdag kl. 08.00 – 15.00

Fredag kl. 08.00 – 14.30

Anæstesi Nord

Tlf. 97 66 29 30

Telefontid:

Mandag – fredag 08.00 – 15.00