



Røntgenundersøgelse af tyndtarmen

Du skal have foretaget en røntgenundersøgelse af tyndtarmen. Til denne undersøgelse kræves kontrastvæske i tarmsystemet.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Umiddelbart inden undersøgelsen får du noget kontrastvæske at drikke. Du skal drikke kontrastvæsken i løbet af nogle få minutter. Kontrastvæsken har svag vaniljesmag og ligner milkshake. Kontrastvæsken hjælper lægen til at tolke røntgenbillederne.

Lægen vil på en Tv-skærm følge, hvordan kontrastvæsken passerer gennem din mavesæk og tyndtarm.

Lægen tager forskellige røntgenbilleder, mens du ligger på et undersøgelsesleje. Røntgenbillederne bliver taget med et interval på ½ - 2 timer, indtil undersøgelsen er afsluttet.

Undersøgelsen varer i alt 3-5 timer, men du ligger kun på undersøgelseslejet, når der bliver taget røntgenbilleder.

Du må gerne have en forælder eller en anden voksen med ind til undersøgelsen.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Mød fastende til undersøgelsen

Du skal faste inden undersøgelsen, så din mavesæk er helt tom. Det er vigtigt, for at vi kan få et godt indblik til organerne og dermed udføre undersøgelsen bedst muligt. Møder du ikke fastende, kan vi være nødt til at aflyse din undersøgelse. Du skal derfor følge disse retningslinjer:

Hvis du er 8 år eller derunder:

Du må ikke spise eller drikke fra 4 timer før undersøgelsen. Heller ikke spise pastiller, bolsjer eller tygge tyggegummi.

Hvis du er 9 år eller derover:

Du må ikke spise, drikke eller ryge fra 6 timer før undersøgelsen. Heller ikke pastiller, bolsjer eller tygge tyggegummi.

Tag din sædvanlige medicin

Får du vigtig medicin, må du gerne tage den inden undersøgelsen. Hvis den skal tages med vand, så brug så lidt vand som muligt.

Medbring læsestof til underholdning

Da undersøgelsen varer 3-5 timer, kan det være en god idé at medbringe læsestof til underholdning.

Hvis du har sukkersyge

Medbring insulin og en madpakke, hvis du har sukkersyge.

NÅR DU KOMMER HJEM

Drik rigeligt efter undersøgelsen

Det er vigtigt, at du drikker rigeligt, det vil sige mere end sædvanligt, dagen efter undersøgelsen for at modvirke forstoppelse.

Du får svar på undersøgelsen

Du får svar på undersøgelsen af den læge eller afdeling, der har henvist dig. Der går cirka 7-10 dage.

MULIGE RISICI

Der er risici forbundet med røntgenstråling. Fordelene ved at bruge røntgenstråler overstiger dog i langt de fleste tilfælde den risiko, der er ved at få foretaget en røntgenundersøgelse. Vil du vide mere om risici, kan du læse mere på patienthaendbogen.dk. Søg på: 'røntgenstråler og risici'.



KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Aalborg Universitetshospital

Radiologisk afdeling

Nord

Tlf. 97 66 50 30

Telefontid:

Mandag – torsdag kl. 08.00 – 15.00

Fredag kl. 08.00 – 14.30