



Ultralydsvejledt fjernelse af væske i bughulen

Du skal have foretaget en ultralydsvejledt kateter-drænage af væsken fra din bughule.

SÅDAN FOREGÅR INDGREBET

Ved indgrebet starter vi med at lokalisere væsken i din bughule ved hjælp af et ultralydsapparat. Lægen fører derefter et kateter ind på det afmærkede sted, så det kan fungere som dræn. Drænet bliver tilsluttet en steril pose og fikseret med sterilt plaster, så væsken langsomt kan løbe ud.

Posen beholder du i, indtil du kommer tilbage til hospitalets dagafsnit. Her holder vi øje med drænet og fjerner den, når al væske er løbet ud.

På trods af, at indgrebet sker i lokalbedøvelse, kan det være forbundet med kortvarig smerte.

Indgrebet varer cirka ½ time.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Vær opmærksom ved blodfortyndende medicin

Får du blodfortyndende medicin, så følg den vejledning, du har fået fra lægen omkring blodprøver og pause med medicinen.

Hold pause med nogle typer medicin

Hold pause forud for indgrebet, hvis du får medicin, der øger risiko for blødning. Aftal med den læge, der har henvist dig, hvordan du holder pause, hvis du får:

- medicin med acetylsalicylsyre, fx Kodimagnyl®, albyl og lignende
- alle former for blodfortyndende behandling.

Anden form for medicin må du tage, som du plejer, medmindre du har fået andet at vide.

MULIGE RISICI

Vi ser sjældent alvorlige komplikationer, men der er en lille risiko for blødning, infektion eller at ramme tarmen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til forløbet efter indgrebet, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Medicinsk Afdeling, Hobro
Tlf. 97 65 24 30