



Røntgenundersøgelse af tyktarmen

Du skal have foretaget en røntgenundersøgelse af tyktarmen.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen foregår ved, at du ligger på et undersøgelsesleje, mens du bliver røntgenfotograferet fra forskellige positioner. Der bliver hældt kontrastvæske ind gennem endetarmen via et kateter (en tynd gummislange), inden du bliver røntgenfotograferet. Kontrastvæsken hjælper lægen til at tolke røntgenbillederne.

Undersøgelsen varer i alt cirka ½-1 time.

Det kan blive nødvendigt, at du skal komme igen dagen efter undersøgelsen, så vi kan tage nogle enkelte supplerende billeder. Hvis det er tilfældet, varer det 5-10 minutter.

Vi giver dig besked på undersøgelsesdagen, hvis det er nødvendigt, at du kommer igen dagen efter.

Du må gerne have en forælder eller en anden voksen med ind til undersøgelsen.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Tag din sædvanlige medicin

Får du medicin, så tag den samme dosis som du plejer, inden du møder hos os, **medmindre** du har fået andet at vide.

Ring til os, hvis du er gravid

Hvis du er – eller kan være – gravid, skal du kontakte os inden aftalen, da det kan have indflydelse på gennemførelsen af undersøgelsen.

NÅR DU KOMMER HJEM

Drik rigeligt efter undersøgelsen

Det er vigtigt, at du drikker rigeligt (mere end sædvanligt) efter undersøgelsen for at modvirke forstoppelse.

Du får svar på undersøgelsen

Du får svaret på undersøgelsen af den læge eller afdeling, der har henvist dig.

MULIGE RISICI

Der er risici forbundet med røntgenstråling. Fordelene ved at bruge røntgenstråler overstiger dog i langt de fleste tilfælde den risiko, der er ved at få foretaget en røntgenundersøgelse. Vil du vide mere om risici, kan du læse mere på patienthaendbogen.dk. Søg på: 'røntgenstråler og risici'.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Radiologisk Afdeling

Tlf. 97 66 50 30

Telefontid:

Mandag – torsdag kl. 08.00 – 15.00

Fredag kl. 08.00 – 14.30