



Forebyggelse eller behandling af blodpropper med Klexane® eller Fragmin®

Du skal i behandling med Klexane® eller Fragmin®. Klexane® og Fragmin® er lægemidler, der virker blodfortyndende. Lægemidlerne bruges til at forebygge eller behandle blodpropper.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Behandlingen starter på hospitalet, hvis du har symptomer på åreforkalkning i hjertet (hjertekrampe), eller hvis der er mistanke om blodprop i hjerte, lunger og/eller ben.

Klexane® og Fragmin® hæmmer virkningen af nogle af de stoffer, der får blodet til at størkne i blodkarrene.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Klexane® og Fragmin® tages som indsprøjtning i underhuden på maven 1-2 gange om dagen.

Du får både medicin, sprøjter, kanyler og andet tilbehør i den afdeling, du tilhører. Vi lærer dig, hvordan du skal tage indsprøjtningerne. Efter udskrivelsen kan en hjemmesygeplejerske også give dig indsprøjtningerne.

Hvis du får brug for mere Klexane® eller Fragmin®, end du har fået udleveret, kan du hente det i afdelingen. Vi vil gerne have, at du afleverer eventuel overskydende Klexane® eller Fragmin® i afdelingen.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger ved behandlingen:

- Blødning, specielt dér hvor du er blevet stukket
- Blodansamlinger på maven

- Allergiske reaktioner (ses meget sjældent).

KONTAKT OG MERE VIDEN

Kontakt os, hvis du oplever bivirkninger, eller hvis du har spørgsmål til behandlingen.



Kontakt

**Hjertemedicinsk Ambulatorium
Thisted**

Tlf. 97 65 01 60

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 9.00 samt
13.00 – 14.30