

Vævsprøve fra leveren (leverbiopsi)

Du skal have taget en vævsprøve (biopsi) fra leveren.

Ved en biopsi udtager vi et lille stykke levervæv. Vævsprøven bruges til at stille diagnosen eller til at vurdere effekten af den behandling, du har fået for din leversygdom.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Du får taget blodprøver inden selve undersøgelsen, hvis ikke de er taget dagen før.

Du får også målt din puls og dit blodtryk.

Når vi har resultaterne på blodprøverne, tager lægen en vævsprøve fra din lever. Det foregår ved hjælp af en kanyle. Inden da er du blevet lokalbedøvet.

Ved undersøgelsen ligger du på ryggen med højre arm under nakken. Lægen tager vævsprøven imellem de nederste ribben i højre side. Huden over indstiksstedet desinficeres med sprit, og du får lagt lokalbedøvelse i det område, hvor lægen stikker dig. I forbindelse med anlæggelsen af lokalbedøvelsen vil du føle, at det svier og spænder i huden, men denne fornemmelse vil hurtigt forsvinde. Du vil hele tiden kunne mærke berøring, men ikke smerte.

Undersøgelsen varer med forberedelse cirka 30 minutter.

Komplikationer

I meget sjældne tilfælde (1-3 ud af 1.000 undersøgelser) kan der forekomme blødning eller udsivning af galde i bughulen. Alle får en smule blødning ud på leveroverfladen. Det vil vise sig som smerter over leveren eventuelt med udstråling til højre skulder, når du trækker vejret. I sværere tilfælde kan det blive nødvendigt at give væske eller blod. Kun i særdeles sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt at foretage en operation for at standse blødningen. Ved galdeudsivning vil du få smerter.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Kontakt os, hvis du får blodfortyndende medicin

Hvis du er i blodfortyndende behandling, skal du holde pause med medicinen efter aftale med lægen.

Vær opmærksom på medicin

- Får du tabletbehandling mod sukkersyge, skal du tage din medicin, som du plejer.
- Lægen, der har besluttet, at du skal til vævsprøvetagning, skal gerne have taget stilling til, om du skal holde pause med blodfortyndende medicin, inden du skal have taget vævsprøven. Hvis du ikke har fået besked herom, skal du kontakte sekretæren senest 1 uge før undersøgelsesdagen med henblik på regulering af den blodfortyndende medicin.
- Får du Plavix® (clopidogrel) eller Hjertemagnyl®, skal du kontakte sekretæren senest 1 uge før undersøgelsen med henblik på, om du skal holde pause med disse præparater.
- Får du anden medicin, må du tage den om morgenen med lidt vand.

Mød fastende til undersøgelsen

Du skal faste inden narkosen, så din mavesæk er helt tom. Det er vigtigt, så der ikke opstår risiko for, at mad i mavesækken kan løbe tilbage gennem spiserøret og ned i lungerne. Møder du ikke fastende, kan vi være nødt til at aflyse din undersøgelse. Du skal derfor følge disse retningslinjer:

- Du må ikke spise fra 6 timer inden undersøgelsen. Du må heller ikke drikke mælkeprodukter eller spise pastiller, bolsjer og tyggegummi.
- Du må gerne drikke klare væsker indtil 2 timer før. Det kan fx være vand, saftvand eller te og kaffe uden mælk.

Følg disse retningslinjer, medmindre narkoselægen har givet dig anden vejledning.



EFTER UNDERSØGELSEN

Forbliv fastende i 2 timer

Efter behandlingen skal du faste i 2 timer.

Bliv i sengen i 6 timer

Efter undersøgelsen skal du ligge i sengen i 6 timer. Du skal ligge på højre side, mens du hviler på en pude.

De første 3 timer ligger du i Medicinsk Ambulatorium, hvor du får målt puls og blodtryk med jævne mellemrum. Hvis det bliver nødvendigt, overflyttes du kortvarigt til Medicinsk Sengeafsnit M4.

Medicinsk Ambulatorium lukker klokken 15.00, og herefter overflyttes du til Akut Sengeafsnit, hvis de 6 timers observation ikke er slut. Hvis der opstår komplikationer, vil du blive indlagt på Sengeafsnit M4.

Forvent at blive udskrevet samme dag

Som regel kan du udskrives samme dag til aftenstuegang, men du har mulighed for at komme tilbage, hvis du får komplikationer i form af åndenød, svimmelhed eller smerter.

Tag hjem eller overnat på Patienthotellet

Når der er gået 6 timer, må du tage hjem, hvis:

- du bor højst 30 minutters kørsel fra Regionshospitalet Nordjylland Thisted og har telefon
- der er en voksen person til at hente dig og være hos dig indtil næste morgen.

Bor du mere end 30 minutters kørsel fra Thisted, eller bor du alene, kan du overnatte på Patienthotellet med en pårørende, eller du kan blive indlagt på Medicinsk Sengeafsnit M4.

NÅR DU KOMMER HJEM

Tag smertestillende ved behov

Du kan opleve ubehag eller smerte i højre skulder samt lettere smerter ved indstiksstedet efter undersøgelsen. Du kan lindre smerterne med smertestillende medicin fra håndkøb.

Vær opmærksom på disse symptomer

I de første 24 timer efter undersøgelsen skal du kontakte din egen læge eller Lægevagten, hvis:

- du bliver svimmel
- du bliver utilpas
- du får smerter
- du får feber.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Vi har svaret på vævsprøven i løbet af 10-14 dage. Vi aftaler med dig, om du skal have svar per telefon, hos din egen læge eller ved en samtale hos os.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vil du vide mere om vævsprøve fra leveren, kan du eventuelt læse mere på patienthåndbogen.dk. Søg på: 'leverbiopsi'.



Kontakt

Medicinsk Ambulatorium

Tlf. 97 65 01 60

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.10 – 9.00, torsdag

dog 8.30 – 9.00

Alle hverdage også 13.00 – 14.30