



# Forebyggelse af blodpropper med Magnyl® eller Hjerdyl®

De fleste kender Magnyl® (acetylsalicylsyre) som et effektivt smertestillende middel mod fx hovedpine. Hvis du anvender det i lavere doser, virker det forebyggende på blodpropper. Hjerdyl® har samme effekt.

Patienter, der har haft blodprop i hjertet eller lider af hjertekrampe, får derfor altid Magnyl® eller Hjerdyl®.

## SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Magnyl® og Hjerdyl® hindrer blodpladerne i at klumpe sammen - og dermed dannelsen af blodpropper.

## SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du kan få Magnyl® og Hjerdyl® i tableter a 75, 100 eller 150 mg. 100 mg-dosis er især beregnet til personer med "sart mave".

Normalt starter du med en dosis på 100-300 mg, hvorefter du går over til 75 mg i døgnet. Du skal som regel tage tableterne om morgenen.

Du skal sluge tableterne hele.

Du kan købe Magnyl® og Hjerdyl® uden recept på apoteket og i håndkøbsudsalg.

## BIVIRKNINGER

Bivirkninger er sjældne, når dosis ikke er højere. Du kan dog få lettere gener med maven. Det sker yderst sjældent, at folk er overfølsomme overfor Magnyl® eller Hjerdyl®.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

**Hjertemedicinsk Ambulatorium  
Thisted**

Tlf. 97 65 01 60

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 9.00 samt  
13.00 – 14.30