



Behandling af hjertekrampe og for højt blodtryk med Norvasc®

Norvasc® er et lægemiddel, der anvendes i behandlingen af hjertekrampe (angina pectoris) og ved behandling af for højt blodtryk.

Eventuelle bivirkninger er ofte milde og kortvarige, men tal med din læge, hvis du får dem.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Norvasc® udvider hjertets kranspulsåre. Derved bliver ilttilførslen til hjertemusklen bedre. Blodkarrene i kroppen udvides også, og det betyder, at blodtrykket sænkes. Derfor er det ikke nødvendigt for hjertet at pumpe så kraftigt.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du kan få Norvasc® som tabletter på 5 og 10 mg. Du begynder med 5 mg, og din dosis stiger eventuelt til 10 mg efter cirka 2-4 ugers behandling.

Du skal kun tage Norvasc® én gang om dagen, normalt om morgenen. Du må ikke ændre på dosis uden at tale med lægen om det.

Du kan kun få Norvasc® på recept. Du kan få mere at vide om tilskud til medicinen på apoteket.

BIVIRKNINGER

Du kan få disse bivirkninger ved behandling med Norvasc®:

- Let kvalme
- Hovedpine
- Varmefornemmelse i ansigtet
- Træthed
- Svimmelhed
- Ansamling af væske omkring anklernerne.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Hjertemedicinsk Ambulatorium Thisted

Tlf. 97 65 01 60

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 9.00 samt
13.00 – 14.30