



Behandling af forhøjet kolesterol med statiner

Du skal i behandling med et præparat, der tilhører lægemiddelgruppen statiner. Statiner anvendes som et supplement til diæt ved forhøjet kolesterol.

Til gruppen hører Canef, Lescol®, Mevacor, Provachol, Simvastatin, Zarvator og Zocor®.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Statiner virker på leveren, så blodets indhold af LDL-kolesterol (Low Density Lipoprotein) nedsættes betydeligt.

For meget af denne type kolesterol i blodet vil med tiden aflejres i blodårerne og resultere i kredsløbslidelser.

Samtidig øger medicinen indholdet af HDL-kolesterol (High Density Lipoprotein). HDL transporterer overskydende kolesterol tilbage til leveren, hvor det udskilles eller nedbrydes.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du kan få statiner som kapsler og tabletter, afhængig af hvilket præparat du får.

Hvis du får kapsler eller tabletter, skal du tage dem, lige inden du går i seng om aftenen.

Du kan kun få statiner på recept. Du kan få mere at vide om tilskud til medicinen på apoteket.

BIVIRKNINGER

Statiner giver kun få og meget sjældent bivirkninger, men du kan opleve:

- udslæt
- gener fra mave og tarm

- søvnløshed
- hovedpine
- ømhed i musklerne.

Hvis du får bivirkninger under behandlingen, skal du kontakte din læge.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Hjertemedicinsk Ambulatorium Thisted

Tlf. 97 65 01 60

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 9.00 samt
13.00 – 14.30