

DC-konvertering af forkammerflimren og forkammerflagren

Du skal have foretaget en såkaldt DC-konvertering. En DC-konvertering er et kontrolleret stød over hjertet, der kan genoprette din normale hjerterytme.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Forberedelser til behandlingen

Når du ankommer til afdelingen, bliver du modtaget og vist til rette af plejepersonalet. Vi skriver journal, du får taget blodprøver, taget EKG (hertekardiogram) samt målt din temperatur. Vi lægger en lille plastikslange (venflon) i din ene håndryg, som vi giver dig bedøvelse igennem. Har du pacemaker, skal den testes og/eller indstilles efter DC-konverteringen.

Behandlingen

DC-konverteringen foregår på en enestue. Der vil være en læge og en sygeplejerske fra afdelingen til stede samt en læge og en sygeplejerske fra narkoseafdelingen.

Vi sætter en elektrode på din brystkasse og en på ryggen. Herefter bliver du kortvarigt lagt i fuld narkose, og når du sover, får du et kontrolleret stød over hjertet gennem elektroderne.

Hele forløbet varer cirka ½ time. Når du vågner af narkosen, er der en sygeplejerske hos dig, som kontrollerer dit blodtryk og din puls.

EFTER KONVERTERINGEN

Du må spise og drikke, når du er helt vågen igen. Du får taget et nyt EKG.

Du skal blive på afsnittet i 2 timer, hvor vi observerer din hjerterytme.

Inden du bliver udskrevet, tager vi stilling til fortsat blodfortyndende behandling samt øvrig medicin.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Fortsæt den blodfortyndende behandling

Det er vigtigt, at du tager den blodfortyndende medicin, som du plejer, da der ellers er risiko for blodprop ved behandlingen med stød over hjertet. Det er meget vigtigt, at du følger de retningslinjer, som du tidligere har fået af lægen.

Hvis du er i behandling med Maravan® eller Marcoumar®, er det meget vigtigt, at din INR-værdi ligger mellem 2 og 3. Det er også vigtigt, at INR-værdien har været stabil i mindst 3 uger op til indlæggelsen – baseret på de ugentlige målinger. Derfor er de ugentlige målinger vigtige. Er din INR-værdi ikke stabil op til indlæggelsen, skal du eller din læge kontakte Dagafsnit S1 på tlf. 97 66 47 57 i tidsrummet 8.00-14.00.

Mød fastende til aftalen

Du skal faste inden bedøvelsen, så din mavesæk er helt tom. Det er vigtigt, så der ikke opstår risiko for, at mad i mavesækken kan løbe tilbage gennem spiserøret og ned i lungerne. Møder du ikke fastende, kan vi være nødt til at aflyse din aftale. Du skal derfor følge disse retningslinjer:

- Du må ikke spise fra 6 timer inden undersøgelsen eller behandlingen. Du må heller ikke drikke mælkeprodukter eller spise pastiller, bolsjer og tyggegummi.
- Du må gerne drikke klare væsker indtil 2 timer før. Det kan fx være vand, saftvand eller te og kaffe uden mælk.

Tag din sædvanlige morgenmedicin

Du skal tage din vanlige morgenmedicin, dog ikke Digoxin® og vanddrivende tabletter samt eventuel medicin mod sukkersyge.

Forbered dig på, at der kan være ventetid

Du skal være opmærksom på, at der kan forekomme ventetid før konverteringen, da tidspunktet for den er afhængig af assistance fra narkoseafdelingen.



NÅR DU KOMMER HJEM

Brug eventuelt fugtighedscreme

Rødmer huden under stødelektroderne, kan du lindre denne rødme med lidt fugtighedscreme.

Kør først bil efter 1 døgn

Du må ikke selv køre bil det første døgn efter konverteringen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Kardiologisk Afdeling

Sengeafsnit S1

Tlf. 97 66 45 00

Hjertemedicinsk Dagafsnit, 7.sal

Tlf. 97 66 47 57

Vi træffes:

Mandag – fredag 8.00-14.00