

Sådan skyller du munden med Tranexamsyre®

Tranexamsyre® 5 % er et middel, der virker ved at hæmme de stoffer i blodet, der opløser størket blod. Du skal skylle munden med stoffet, hvis du skal have foretaget indgreb hos tandlægen eller skal til behandling på Kæbekirurgisk Afdeling.

Sådan gør du

Du har fået udleveret et hætteglas, der indeholder 10 ml. Følg denne anvisning:

- Åbn glasset ved at trække kapslen af. Vip først kapslen op og træk derefter ned for at få det hele af. Skub derefter proppen op.
- Gem proppen.
- Lige før behandlingen eller indgrebet skal du skylle munden med halvdelen af den udleverede medicin (5 ml) i 2 minutter. Gem resten af medicinen til efter behandlingen eller indgrebet, hvor du eventuelt kan gentage skylningen, hvis der fortsat er blødning.
- Sæt proppen på med det samme.

Mulige bivirkninger

Behandlingen giver normalt ingen bivirkninger, men nogle få oplever let kvalme.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kardiologisk Afdeling

Trombosecenter Aalborg

Tlf. 97 66 45 40

Vi træffes bedst: Mandag, onsdag og fredag 9.00 – 15.00