



Vævsprøve fra leveren (leverbiopsi)

Ved en leverbiopsi udtages en lille vævsprøve fra leveren. Vi bruger undersøgelsen til at sikre en diagnose ved mistanke om en leversygdom, men biopsien kan også bruges til at vurdere effekten af en given behandling.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Inden undersøgelsen får du målt din puls og dit blodtryk.

Ved undersøgelsen ligger du med højre arm under nakken.

Først desinficerer vi huden over leveren, og derefter lægger vi lokalbedøvelse under huden med en sprøjte. Herefter udtager vi vævsprøven fra leveren med en kanyle.

Det gør ikke ondt at få taget en vævsprøve. Du kan dog opleve ubehag eller have smerter i højre skulder samt lettere smerter ved stikkestedet efter undersøgelsen.

Undersøgelsen varer cirka ½ time.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Mød fastende til aftalen

Du må ikke ryge, spise eller drikke de sidste 4 timer før undersøgelsen.

Få taget blodprøve på nærmeste sygehus

Du skal have taget blodprøver på nærmeste sygehus forud for undersøgelsen. Vores sekretær har bestilt de blodprøver, du skal have taget, og du får besked om, hvornår de skal tages, til forundersøgelsen.

Undlad at tage eventuel morgeninsulin

Får du insulin, skal du undlade at tage din morgeninsulin. Du vil få tilbudt et måltid efter undersøgelsen.

Du skal medbringe din insulin og tage halv dosis i forbindelse med dette måltid.

Har du sukkersyge, der behandles med tabletter, skal du tage din medicin, som du plejer.

Hold pause med blodfortyndende medicin

Får du blodfortyndende medicin, fortæller lægen dig, hvor lang tid du skal holde pause med den før undersøgelsen.

EFTER UNDERSØGELSEN

Du skal forblive fastende de første 2 timer efter undersøgelsen og observeres på en observationsstue i 4 timer. I løbet af denne periode måler vi dit blodtryk og din puls regelmæssigt.

Du må tage hjem 4 timer efter undersøgelsen, hvis du er under opsyn af en pårørende de næste 24 timer. Har du ingen til at være hos dig, vil du blive på Lungemedicinsk Sengeafsnit 6V til næste dag.

NÅR DU KOMMER HJEM

Kontakt lægen, hvis du bliver utilpas eller får feber

Bliver du svimmel, utilpas, får smerter eller feber, efter du er kommet hjem, skal du kontakte din egen læge eller Lægevagten.

Hold dig i ro det første døgn

Vi anbefaler, at du det første døgn efter undersøgelsen holder dig helt i ro, meget gerne liggende.

Tag gerne en pårørende med til svarsamtalen

Inden du bliver udskrevet, får du en tid med hjem til en samtale i Lungemedicinsk Dagafsnit, hvor du får svar på undersøgelsen. Det kan være en god idé at tage en pårørende med til samtalen, da der kan være mange informationer at forholde sig til.



MULIGE KOMPLIKATIONER

1/3 oplever lettere smerter omkring det sted, hvor vævsprøven er taget, efter operationen.

Meget sjældent (1-3 per 1000 undersøgelser) kan der forekomme blødning eller galdeudsiven i bughulen.

Særligt om uddannelse af sundhedspersonale

På Aalborg Universitetshospital uddanner og underviser vi sundhedspersonale. Derfor vil du ind imellem opleve, at sundhedspersonale, der er under uddannelse, deltager aktivt i undersøgelser, behandling og pleje. Ønsker du ikke, at de medvirker, skal du fortælle os det.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Lungemedicinsk Dagafsnit
Tlf. 97 66 48 00

Du skal møde til undersøgelse:

_____ dag den _____ kl. _____

Aalborg Universitetshospital, Syd
Lungemedicinsk Sengeafdeling 6V
Medicinerhuset
9000 Aalborg

Forud for undersøgelsen skal du have taget en blodprøve på nærmeste sygehus.

Blodprøven skal tages:

Du skal møde til svar på undersøgelsen:

_____ dag den _____ kl. _____

Aalborg Universitetshospital, Syd
Lungemedicinsk Dagafsnit, reception 1
Medicinerhuset
9000 Aalborg