

Kikkertundersøgelse af lungerne i fuld narkose

Du skal have lavet en kikkertundersøgelse af lungerne, også kaldet en bronkoskopi. Vi laver undersøgelsen for at se, hvordan slimhinden i luftvejene ser ud. Ofte tager vi også vævsprøver (biopsier) af bronkierne og suger slim ud, som efterfølgende bliver undersøgt for celleforandringer og bakterier.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Ved undersøgelsen er du fuldt bedøvet. Du føler derfor ingen gener.

Inden du bliver bedøvet, får du et drop, som giver dig væske gennem et plastikrør i håndryggen. Lægen taler først med dig om, hvad der skal foregå, og herefter bliver du bedøvet.

Undersøgelsen bliver foretaget ved hjælp af en kikkert - en tynd, bøjelig slange, som vi fører ned i luftvejene gennem din mund.

Vi måler din puls, dit blodtryk og iltindholdet i dit blod under hele undersøgelsen.

Undersøgelsen varer cirka 1 time.

Efter undersøgelsen bliver du kørt til opvågningsstuen, hvor du bliver observeret i cirka 1-2 timer, inden du kan tage hjem.

I yderst sjældne tilfælde, når der er taget vævsprøver af lungen, kan luft slippe ud i lungesækken, så lungen klapper sammen. Sker det, kan vi hurtigt behandle det ved at anlægge et dræn. I så fald skal du være indlagt i 1 døgn herefter.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Mød fastende til undersøgelsen

Du skal faste inden undersøgelsen, så din mavesæk er helt tom. Det skal du for at undgå, at

maveindholdet løber i luftvejene. Møder du ikke fastende, kan vi være nødt til at aflyse din aftale. Du skal derfor følge disse retningslinjer:

- Du må ikke spise fra 6 timer inden undersøgelsen. Du må heller ikke ryge, drikke mælkeprodukter eller spise pastiller, bolsjer og tyggegummi.
- Du må gerne drikke klare væsker indtil 2 timer før. Det kan fx være vand eller te og kaffe uden mælk. Du må ikke drikke juice med frugtkød.

Hold pause med blodfortyndende medicin

Får du blodfortyndende medicin, skal du eventuelt holde pause før undersøgelsen. Følg de instrukser, du har fået af lægen.

EFTER UNDERSØGELSEN

Undlad at spise 1 time efter undersøgelsen

Du skal være fastende 1 time efter undersøgelsen for at undgå fejlsynkning, mens dine synkereflexer er påvirket af bedøvelsen.

Aftal at blive hentet af en pårørende

Vær opmærksom på, at du ikke selv må køre hjem. Det skyldes, at din reaktionstid er nedsat, fordi du har været bedøvet. Sørg derfor for at have en pårørende til at ledsage dig eller køre dig hjem. Du må ikke selv køre bil det første døgn efter, at du har været bedøvet.

NÅR DU KOMMER HJEM

Forvent at blive øm i halsen

Efter undersøgelsen kan du være øm i halsen, hæs og have smerter, når du synker. Det forsvinder normalt efter et par dage. Hvis vi i forbindelse med undersøgelsen har taget vævsprøver af din lunge eller dine bronkier, kan du hoste blodigt slim op det første døgn efter undersøgelsen. Det er ikke farligt og kræver normalt ingen behandling.



VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Reagér, hvis du får høj feber eller åndenød

Får du høj feber, åndenød, eller begynder du at hoste større mængder blod op efter undersøgelsen, er det vigtigt, at du tager kontakt til Lægevagten eller ringer 112.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Inden du tager hjem, aftaler vi, om du får svar på undersøgelsen per brev, eller du får en tid med hjem til samtale i Lungemedicinsk Dagafsnit.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din sundhedsfaglige kontaktperson.



Kontakt

Lungemedicinsk Dagafsnit
Tlf. 97 66 48 00