

Provokationstest ved mistænkt medicinallergi (kort provokation)

Du skal have lavet en såkaldt provokationstest, fordi der er mistanke om, at du har allergi over for medicin. Testen laves, hvis du tidligere har haft allergiske symptomer i forbindelse med brug af medicin.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Inden undersøgelsen begynder, gennemgår en sygeplejerske, om oplysningerne om din nuværende medicin stadig er rigtige. Hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder, spørger vi dig, om du er gravid.

Vi giver dig en tablet med det indholdsstof, som du skal undersøges for allergi overfor og vi spørger til, hvordan du har det. Hvis der ikke har været nogen reaktion 30 minutter efter sidste dosis, afslutter vi undersøgelsen.

Undersøgelsen var ca. 2 timer.

Der vil altid være en sygeplejerske i nærheden, som du skal give besked, hvis du får tegn på allergisk reaktion.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Undlad visse typer medicin

Undlad at tage allergimedicin i form af antihistaminer (også håndkøb) i 3 døgn før testen. Visse typer blodtryksmedicin må ikke tages 1-3 døgn før testen (som aftalt med lægen).

Giv os besked, hvis du får antibiotika

Får du behandling med antibiotika, skal der gå mindst 3 uger, fra behandlingen er ophørt, og til du laver prøven. Ring derfor til os, hvis du kommer i behandling med antibiotika op til prøven.

Medbring gerne underholdning

Medbring gerne læsestof, håndarbejde, computer eller lignende, så du kan få tiden til at gå i de cirka 2 timer, som undersøgelsen varer.

Kontakt os forud for undersøgelsen, hvis du:

- får binyrebarkhormon (Prednisolon)
- har påbegyndt ny medicin, efter du er blevet henvist til undersøgelsen
- er i tvivl om fx håndkøbsmedicin
- er gravid.
- Har betændelse i kroppen og er påbegyndt antibiotisk behandling.

NÅR DU KOMMER HJEM

Hvis der opstår tegn på allergisk reaktion, skal du kontakte os førstkommande hverdag.

Hvis du får en kraftig reaktion, som kræver akut behandling, skal du selvfølgelig kontakte Lægevagten.

Du skal fortsætte med tabletbehandling derhjemme i 1 uge, så vi kan se, om du får en senreaktion i form af hududslæt. Hvis du skal fortsætte med at tage medicin derhjemme, får du nærmere information i forbindelse med undersøgelsen.

Hvis vi ikke har hørt fra dig efter 3 uger, går vi ud fra, at du ikke fik nogen reaktion på medicinen.

Din praktiserende læge får besked om undersøgelsens resultat.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL
– i gode hænder



Kontakt

Lungemedicinsk Ambulatorium

Tlf. 97 66 48 00

Vi træffes:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00