



Sådan håndterer du din medicin før operation

I denne pjece kan du læse om retningslinjerne for, hvordan du skal forholde dig med hensyn til eventuel medicin inden din hofte- eller knæoperation.

SÅDAN GØR DU

Hold 10 dages pause med gigt- og naturmedicin

Smerter i hofte og knæ behandles ofte med smertestillende gigtmedicin. Gigtmedicin påvirker blodets evne til at størkne og øger dermed risikoen for blodtab. Det er derfor vigtigt, at du holder pause med gigtmedicin inden din operation.

Måske tager du også naturmedicin på grund af dine smerter. Naturmedicin kan også påvirke blodets evne til at størkne og have andre uheldige påvirkninger i forbindelse med en operation.

Generelt skal du holde pause i 10 dage med følgende medicin forud for operationen:

- **Al gigtmedicin**, fx Brufen®, Ipren®, Ibuprofen, Confortid, Diclon®, Ibumetin®
- **Al naturmedicin**, fx baldrian, E-vitamin, fiskeolie, ginkgo biloba, ginseng, hvidløg, ingefær, echinacea.

Som erstatning til din vanlige medicin anbefaler vi:

- **Medicin med paracetamol:** Pamol®, Panodil®, Pinex® (håndkøbsmedicin)
- **Receptpligtig smertestillende medicin** som Dolol®, Mandolgin®, Nobligan®, Tradolan® (kræver alle recept fra din egen læge).

Tal med anæstesilægen om øvrig medicin

Hvis du tager anden medicin, fx hjertemedicin, medicin for forhøjet blodtryk, stofskiftesygdom eller diabetes, skal du tale med anæstesilægen ved forundersøgelsen om, hvorvidt du skal holde pause med medicinen i forbindelse med operationen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Du er altid velkommen til at spørge os til råds med hensyn til medicin. Er du i tvivl om, hvilken medicin du får, så kontakt din egen læge.



Kontakt

Ortopædkirurgisk Sengeafsnit 04

Tlf. 97 65 30 50

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 14.30