

Sådan håndterer du en Walkerbandage

Du har fået en Walkerbandage på foden for at aflaste fodleddet eller foden.

Nogle patienter må støtte på foden og tage Walkerbandagen af om natten, andre må ikke. Når du får bandagen på, fortæller vi dig, hvordan du skal forholde dig.

Sådan gør du

Sørg for, at bandagen sidder rigtigt

Din hæl skal være helt tilbage i bandagen. Beskyt hælen med plaster eller andet, hvis du får tegn på vabler. Får du store vabler, skal du kontakte os.

Bandagen må ikke stramme. Du kan selv regulere, hvor stramme stropperne skal være.

Hvis du må tage bandagen af

Når du skal tage bandagen af, skal du først løsne alle stropperne og derefter polsteret. Du skal fjerne hele bandagen på én gang. Vi instruerer dig grundigt, når du får bandagen på.

Hvis du ikke må tage bandagen af

Hvis du ikke må tage bandagen af, er det vigtigt, at du aflaster foden af og til. Sid eller lig med benet hævet og løsn alle stropperne.

Tag smertestillende medicin efter behov

Hvis du har smerter i de første dag, kan du lindre smerterne med smertestillende medicin fra håndkøb. Følg vejledningen på pakken.

Kontrol

Vi indkalder dig til kontrol i Kirurgisk Ambulatorium, så vi kan vurdere, hvordan dit brud heler.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Dagkirurgisk Afsnit

Tlf. 97 65 06 15

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 7.30 – 16.30

Tlf. 97 65 05 43

Vi træffes bedst: Efter 16.30

Medicinsk-Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, Thisted

Tlf. 97 65 01 10

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 8.00 – 14.30