

Behandling med lægemidlet Fampyra

Du skal i behandling med lægemidlet Fampyra. Formålet med behandlingen er at forbedre evnen til at gå for voksne med multipel sklerose, der lider af gangbesvær.

Sådan virker medicinen

For at kroppens muskler kan trække sig sammen – som de skal, når du går – skal der sendes elektriske impulser til musklerne langs med nerverne. Ved multipel sklerose hæmmes de elektriske impulser, fordi de beskyttende hinder omkring nerverne bliver beskadiget. Det kan føre til muskelsvaghed, muskelstivhed og gangbesvær.

Det aktive stof i Fampyra (fampridin) virker formentlig på de beskadigede nerver ved at forhindre ladede kaliumpartikler i at forlade nervecellerne. Dermed kan den elektriske impuls fortsat bevæge sig langs nerverne for at stimulere musklerne, og det bliver lettere at gå.

Sådan foregår den medicinske behandling

Fampyra er tilgængeligt som depottabletter (10 mg). Du skal tage 1 tablet via munden 2 gange dagligt med 12 timers mellemrum. Tabletterne skal tages uden mad.

Evaluering af behandlingen

Inden du begynder at bruge Fampyra, skal du udfylde et spørgeskema (MS Walking Scale) og udføre en gangtest. Lægen kontrollerer desuden din nyrefunktion ved hjælp af en blodprøve.

Efter 2 ugers brug udfylder du igen et spørgeskema, udfører en gangtest, og fortæller lægen om din oplevelse ved at bruge Fampyra. Hvis lægen konstaterer, at du har en relevant klinisk effekt af Fampyra, kan du fortsætte behandlingen. Hvis din evne til at gå er forværret, eller du ikke har effekt af behandlingen, skal den standses.

Fortsætter du behandlingen med Fampyra, skal du gangtestes 1 gang om året for at sikre, at der fortsat er effekt. Desuden skal du samtidig have kontrolleret din nyrefunktion ved hjælp af en blodprøve.

Bivirkninger

Du kan opleve følgende bivirkninger:

- **Urinvejsinfektion**

- **Psykiske forstyrrelser.** Søvnløshed og angst.
- **Påvirkning af nervesystemet.** Du kan opleve anfald, svimmelhed, kraftsløshed, få hovedpine, balanceforstyrrelser og rysten.
- **Luftvejsbesvær.** Smerter i svælget. Åndenød.
- **Mave-tarmproblemer.** Kvalme, opkastning og forstoppelse og fordøjelsesbesvær.
- **Knogle- og ledsmerter.** Smerter i ryggen.

Vær opmærksom på

Tag ikke Fampyra, hvis du er gravid eller ammer

Det vides ikke om lægemidlet har betydning i forbindelse med graviditet eller amning, men for en sikkerheds skyld bør du ikke tage medicinen, hvis du er gravid eller ammer. Fampyra påvirker ikke evnen til at blive gravid.

Søg læge, hvis du får smerter ved vandladning

Urinvejsinfektion er en almindelig bivirkning og skal behandles med antibiotika. Kontakt derfor din læge, hvis du får smerter eller svie, når du lader vandet.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Skleroseambulatoriet

Sygeplejersker
Tlf. 97 66 22 97
Vi træffes bedst: Mandag – fredag 8.15 – 9.15

Sekretær
Tlf. 97 66 23 00 – Tast 1 for ambulatorium. Tast dernæst 2 for Skleroseambulatoriet.
Vi træffes bedst: Mandag – fredag 8.00 – 12.00