

Liquordynamisk trykmåling

Du skal have undersøgt trykforholdene i rygmarvsvæsken for at se, om vi kan få afklaret årsagen til dine symptomer. Undersøgelsen kaldes en liquordynamisk trykmåling.

I hjernen er der 4 hulrum, som er fyldt op med rygmarvsvæske. Rygmarvsvæsken cirkulerer fra rygmarven op til hjernens hulrum og udtømmes til sidst i blodbanen. Ved et forhøjet tryk i hjernens væsketryk kan man blandt andet opleve symptomer som hovedpine, synsforstyrrelser, svimmelhed, kvalme og opkastninger.

Ved en liquordynamisk trykmåling måles dannelsen af rygmarvsvæske, modstand i systemet og trykforhold. Undersøgelsen er også vigtig for at kunne klarlægge, om der findes behandlingsmuligheder.

Vi indlægger dig på dagen for undersøgelsen, og forventer, at du bliver udskrevet igen samme dag.

Sådan foregår undersøgelsen

Du bliver modtaget på sengeafdelingen af din kontaktsygeplejerske, som vil informere dig om, hvordan indlæggelsen skal foregå samt svare på dine spørgsmål. Derefter skal du have lavet en skanning af din hjerne, medmindre vi har bedt dig få det gjort få dage inden indlæggelsen.

Selve undersøgelsen

Du bliver fulgt til ambulatoriet, hvor den liquordynamiske undersøgelse skal foretages. Undersøgelsen foregår i en speciel seng, hvor der er hul i ryglænet. Sengen fungerer både som stol og seng under undersøgelsen. Sygeplejersken hjælper dig med at komme på plads.

Lægen markerer først det sted nederst på ryggen, hvor nålene skal placeres. Herefter bliver du lokalbedøvet. Når bedøvelsen virker, fører lægen en tynd nål ind i ryggen, til den får kontakt med rygmarvsvæsken. Nålen skal blive siddende i ryggen gennem hele undersøgelsen. Når nålen sidder, som den skal, bliver sengen sænket, så du ligger ned, og undersøgelsen går i gang.

Det er vigtigt, at du ligger så stille som muligt under undersøgelsen for at få det bedste resultat. Undersøgelsen varer cirka 1 time.

Efter undersøgelsen

Efter undersøgelsen bliver du fulgt tilbage til sengeafdelingen. I de fleste tilfælde skal du til en udskrivningssamtale med lægen. Her får du undersøgelsens resultater, og I taler om det videre forløb.

Hvis du har mulighed for at have en pårørende med til samtalen, vil det være godt.

Sådan forbereder du dig

Tag ikke blodfortyndende medicin

Hvis du får blodfortyndende medicin, såsom Marevan, Clopidogrel, Brilique, Pradaxa® eller Xarelto®, er det vigtigt, at du holder pause med medicinen inden undersøgelsen. Tager du Magnyl® eller Persantin®, skal du ikke holde pause.

Få taget blodprøver inden undersøgelsen

Mandag inden indlæggelsen skal du sørge for at få taget blodprøver. Vi har bestilt prøverne, men du skal selv booke tiden enten på et sygehus eller hos din egen læge.

Når du kommer hjem

Start blodfortyndende behandling dagen efter

Du kan starte din blodfortyndende behandling igen dagen efter undersøgelsen.

Fjern plaster

Du må fjerne plasteret cirka 24 timer efter undersøgelsen.

Tag smertestillende ved behov

Du kan opleve ømhed ved indstiksstedet over lænden. Det er ufarligt. Tag eventuelt smertestillende medicin fra håndkøb. Følg anvisningen på pakken.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.



Liquodynamisk Laboratorium

Tlf. 97 66 23 00 – Tast 1 for ambulatorium. Tast dernæst 6 for Liquodynamisk Laboratorium.

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 8.00 – 12.00