

# Behandling af nervesmerter med Pregabalin

Pregabalin anvendes til nervesmerter. Pregabalin findes i præparatet Lyrica®.

## Sådan virker behandlingen

Pregabalin anvendes til behandling af trigeminusneuralgi, ansigtssmerter og andre nervesmerter. Pregabalin anvendes desuden til behandling af epilepsi og angst.

## Sådan tager du medicinen

Start med at tage 25 mg 2 gange dagligt i 5 dage. Øg herefter dosis til 50 mg 2 gange dagligt i 5 dage. Herefter kan du øge dosis til 75 mg 2 gange dagligt.

Tåler du pregabalin godt, kan du ved behov efter yderligere 1 uge øge til 150 mg 2 gange dagligt.

Yderligere øgning af dosis må kun ske efter samtale med læge eller hovedpinesygeplejerske.

## Mulige bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er svimmelhed, hovedpine, træthed og øget appetit.

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer. Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende hjerte. Behandling er forbundet med en let øget risiko for selvmordstanker.

Alkohol og lægemidlet Lorazepam forstærker midlets sløvende virkning. Du rådes til forsigtighed ved bilkørsel og maskinbetjening.

## Sådan fungerer din recept

Recepter er elektroniske, og du kan derfor afhente medicin på alle apoteker i landet. Apoteket udleverer altid det billigste præparat til dig. Derfor kan den ordinerede medicin blive udleveret med andet navn og udseende, men indholdsstoffet og virkningen vil være den samme.

## Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### **Neurologisk Ambulatorium, Hovedpineambulatoriet**

Tlf. 97 66 23 00 – Tast 1 for ambulatorium. Tast dernæst 5 for  
Hovedpineambulatoriet.

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 8.00 – 12.00