



Laseroperation af efterstær

Efterstær er en nyopstået uklarhed i øjets linsekapsel, som sidder bag den kunstige linse, der blev indsat i øjet i forbindelse med din grå stær-operation.

Efterstær medfører sløret syn, ligesom da du i sin tid fik grå stær. Efterstær opstår efter måneder til år hos cirka 20 % af grå stær-opererede øjne.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Efter at øjet er blevet grundigt undersøgt, og lægen er blevet sikker på, at sløringen af synet skyldes efterstær, skal du sidde i en almindelig øjenundersøgelseslampe med tilkoblet laserudstyr. Operationen varer cirka 2-5 minutter.

Du vil opleve nogle små lysglimt, men ikke mærke smerte. Ved indgrebet benyttes laserstrålerne til at lave en åbning i den uklare linsekapsel, så lyset atter kan passere uhindret gennem øjet.

Risiko og komplikationer

Behandlingsrisikoen er lille og komplikationer sjældne. Der kan optræde forbigående trykforhøjelse eller regnbuehindebetændelse i det behandlede øje. Vi forebygger disse komplikationer ved at give dig øjendråber umiddelbart efter behandlingen.

Derudover er der en let øget risiko for nethindeløsning samt hævelse i macula (den gule plet) med nedsat syn til følge.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Medbring solbriller

Stærkt sollys kan være generende umiddelbart efter behandlingen, derfor er det godt at medbringe et par solbriller til brug under hjemtransporten.

EFTER OPERATIONEN

Kør ikke bil efter operationen

Du må ikke selv køre bil hjem fra operationen. Aftal derfor at blive kørt af en pårørende, eller undersøg hos Kontoret for Patientbefordring, om du er omfattet af reglerne for bevilling af kørsel.

NÅR DU KOMMER HJEM

Forvent små synsforstyrrelser i tiden efter

Forvent at se "myg" eller "spindelvæv" i synsfeltet på det opererede øje i et stykke tid. Det skyldes, at efterstæren er blevet knust til mange små partikler, som bevæger sig rundt i øjet. Fænomenet er helt ufarligt.

Ved manglende synsbedring uger efter behandlingen skal du kontakte din praktiserende øjenlæge.

Kontakt os ved stærke smerter, tiltagende rødme eller aftagende syn

Får du stærke smerter, eller bliver øjet rødt og synet dårligere indenfor få dage efter behandlingen, så kontakt straks Øjenafdelingen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Øjenafdelingens Ambulatorium

Tlf. 97 66 25 85

Mandag – torsdag 8.00 – 15.30

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 9.00 – 13.00

Hverdage 15.30 – 8.00, weekend- og

Helligdage kan du få kontakt til os her:

Øjenafdelingens Sengeafsnit

Tlf. 97 66 24 56