



Sådan standser du blødning i munden

Du er blevet opereret i munden og kan derfor opleve blødning fra mundhulen efterfølgende. Her kan du se, hvordan du standser blødning og forebygger ny blødning.

SÅDAN GØR DU

Stands blødning med kompres

Har du blødning fra det sted i munden, hvor du er blevet opereret, så standser du blødningen således:

- Tag et stykke gaze – en "gaze-krølle".
- Gennemvæd den med tranexamsyre (Pileaxam®) fra en ampul (5 ml). Du skal bruge mellem en tredjedel og halvdelen af væsken i ampullen.
- Læg gazen løst på det blødende sted i munden og bid sammen på det i 30 minutter.
- Fjern gazen forsigtigt.

Opbevar resten af væsken i ampullen i køleskab.

Forebyg blødning med mundskylning

Har du tendens til blødning fra det sted, hvor du er blevet opereret, kan du forebygge blødning ved at skylle munden med tranexamsyre (Pileaxam®). Gør således:

- Åbn en ampul (5 ml).
- Fortynd væsken med 5 ml vand.
- Hold blandingen i munden i 2 minutter.
- Spyt ud.
- Gentag mundskylningen 4 gange dagligt.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Kæbekirurgisk Afdeling

Tlf. 97 66 27 95

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag kl. 09.00 – 14.00

Sygeplejerske (telefonkonsultation)

Tlf. 97 66 28 01

Mandag – fredag 12.30 – 14.00