



Sådan behandler du med Protopic®

Protopic® bruges til lokalbehandling af lichen sclerosus og lichen planus samt mange eksem sygdomme.

Det aktive stof i Protopic® hedder tacrolimus og er et immunmodulerende stof. Det betyder, at stoffet dæmper immunsystemet i huden, så irritation og kløe mindskes.

Sådan gør du

- Smør et tyndt lag salve på den hud, der skal behandles, og gnid forsigtigt salven helt ind.
- Anvend salven 2 gange dagligt i 6-12 uger.
- Efter 6-12 uger sættes anvendelsen ned til 2 gange om ugen. Behandl 1 gang pr dag, fx mandag og torsdag aften.

Bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger:

- En varme og/eller brændende fornemmelse ved påsmøringsstedet. Dette går over i løbet af 5-7 dage.

Almindelige bivirkninger:

- Hudinfektion, fx impetigo, der er en bakteriel infektion.
- Let afskalning af huden, tørhed, hævelse og forværring af eksem symptomer.

Hvis du udvikler hudinfektion eller forværring af dine symptomer, så kontakt egen læge eller Gynækologisk Ambulatorium.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vil du vide mere om lichen sclerosus eller lichen planus, kan du eventuelt læse mere på <https://patienthåndbogen.dk> – søg på: 'lichen'.



Gynækologisk Ambulatorium

Tlf. 97 66 04 30

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 9.00 – 11.00