



Sådan bruger du inkontinensring, når du har problemer med ufrivillig vandladning

Du kan bruge en inkontinensring for at afhjælpe dine problemer med ufrivillig vandladning.

Inkontinensringen understøtter urinrøret, så du mindsker eller helt undgår utæthed. Ringen er lavet af silikone.

Første gang du skal have lagt en inkontinensring op i skeden, foregår det i Ambulatorium for Gynækologi. Lægen eller sygeplejersken vurderer, hvilken type og størrelse ring der passer til dig. Lægen/sygeplejersken lægger ringen op i din skede og vejleder dig eventuelt i, hvordan du selv kan fjerne og lægge ringen op.

Sådan gør du

Skift eller rens inkontinensringen hver 3. måned

Inkontinensringen skal skiftes eller renses cirka hver 3. måned. Du kan selv fjerne ringen, rense den og lægge den op i skeden igen.

Du må gerne tage ringen ud og skylle den oftere end hver 3. måned, fx i forbindelse med samleje eller ved behov.

Sådan tager du ringen ud

- Indtag den stilling, der er mest bekvem for dig – stå fx med spredte ben eller med den ene fod på kanten af toiletsædet, eller sid på hug.
- Tag fat om ringen med 1 eller 2 fingre, og træk den ud.
- Vask ringen med mild sæbe, fx håndsæbe, og skyl den godt.

Sådan lægger du ringen op

- Indtag den stilling, der er mest bekvem for dig – stå fx med spredte ben eller med den ene fod på kanten af toiletsædet.
- Fugt ringen med vand, eller smør den med lidt vaseline eller olie for at lette indføringen.
- Fold ringen ved at presse siderne sammen. Er der en knop på, skal den ligge i din håndflade. Hvis du har en 'dish', skal du holde den som en skål.
- Skil dine kønslæber med den anden hånd.
- Skub ringen langt bagud i skeden, mens du stadig klemmer sammen om ringen.
- Skub knoppen opad med fingerspidsen, når ringen er helt inde i skeden. Derved sætter ringen sig i spænd mod skambenet.
- En eventuel knop skal sidde fortil i skeden.



- Fortvivl ikke: al begyndelse er svær. Læs vejledningen grundigt i gennem, inden du går i gang, og hav den eventuelt ved hånden de første par gange.

Vær opmærksom på

Tag hormontilskud, hvis du er i overgangsalderen

Hvis du er omkring eller har passeret overgangsalderen, anbefaler vi, at du bliver behandlet med hormon lokalt i skeden, så længe du bruger inkontinensring.

Hormonet styrker slimhinden i skeden. Du kan få hormontilskuddet enten som stikpiller 2 gange om ugen eller som en hormonring, der skal skiftes hver 3. måned. Vi giver dig en recept på den type hormon-tilskud, du ønsker.

Kontakt os ved gener

Kontakt os eller din egen læge, hvis du oplever følgende gener af inkontinensringen:

- problemer med din vandladning
- ildelugtende udflåd eller kløe
- blødning fra skeden
- ringen generer dig
- ringen falder ud.

Kontrol

Hvis du selv kan tage ringen ud og genanlægge den, er kontrol ikke nødvendig. Hvis det derimod ikke er muligt for dig, anbefaler vi rensning af ringen hver 3.-6. måned hos din egen læge.

Du har fået anlagt følgende ring

_____ Ring med knob

_____ Ring med knob og support

_____ Inkontinensdish

Nr: _____ mm.

_____ Milex

_____ Bioteque



Holdbarhed

Ringen har en holdbarhed på op til 5 år. Du kan købe nye ringe på apoteket eller via internettet.

- Milex-ringe kan købes ved telefonisk henvendelse til Fischer Medical, tlf: 45938100.
- Se produkter på hjemmesiden: www.fischermedical.dk
- Bioteque-ringe kan købes i webshoppen: www.sacomed.dk

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os så længe du er tilknyttet Gynækologisk Ambulatorium.



Gynækologisk Ambulatorium, sekretær (tidsbestilling m.m.)

Tlf. 97 66 04 30

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 9.00 – 11.00

Uro-gynækologisk sygeplejerske

Tlf. 97 66 04 44

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 8.00 – 8.30

Eksempler på ringe

