



Oplægning af nedfrosne æg

Du har i forbindelse med din fertilitetsbehandling fået nedfrosset overskydende æg, som du nu skal have lagt op i livmoderen.

Hvis du har regelmæssige menstruationer, kan et fryseæg lægges op i livmoderen i en naturlig cyklus. Det vil sige uden, at du ikke skal have hormoner. De kvinder, som har uregelmæssige menstruationer eller cyklus over 35 dage, har behov for hormoner i form af tabletter.

Du skal tilmelde dig oplægning af fryseæg på din første menstruationsdag. Tilmeld dig ved at gå ind på vores hjemmeside <https://aalborguh.RN.dk/fertilitet> og klikke på boksen "Tilmelding til behandling".

OBS: Hvis behandlingen er til barn nummer 2, skal du være færdig med at amme, inden du melder dig til behandling med fryseæg.

Oplægning ved regelmæssig menstruation

Hvis du har regelmæssige menstruationer, vil du få en tid til skanning på 10.-12. cyklusdag. Vi vil bede dig tage en ægløsningstest aftenen inden og om formiddagen inden skanningen. Ved skanningen vurderer vi, hvor tyk slimhinden i livmoderen er, og hvor stor månedens ægblære er. Hvis ikke ægblæren er stor nok, vil vi skanne igen et par dage senere.

Når ægblæren har den rigtige størrelse, skal du tage Ovitrelle om aftenen, og ægoplægningen planlægges til en uge efter. Tidspunktet for ægoplægningen er mellem kl. 13.00 og 14.00.

Efter ægoplægningen skal du have progesteron via skeden og fortsætte med dette frem til graviditetstesten, som foretages 16 dage efter Ovitrelle-injektionen.

Oplægning ved uregelmæssig menstruation

Hvis du ikke har regelmæssig menstruation, eller din cyklus er over 35 dage, skal du have hormon i form af letrozoltabletter, du skal tage 1 – 2 tabletter i 5 dage og du skal starte på 3. cyklusdag. Vi vil skrive til dig, hvornår og hvordan du skal tage tabletterne. Tabletterne skal fremkalde en ægløsning hos dig.

Du vil få en tid til skanning på 10.-12. cyklusdag. Vi vil bede dig tage en ægløsningstest aftenen inden og om formiddagen inden skanningen. Ved skanningen vurderer vi, hvor tyk slimhinden i livmoderen er, og hvor stor månedens ægblære er. Hvis ikke ægblæren er stor nok, vil vi skanne dig igen et par dage senere.



Når ægblæren har den rigtige størrelse, skal du tage Ovitrelle om aftenen, og ægoplægningen planlægges til en uge efter. Tidspunktet for ægoplægningen er mellem kl. 13.00 og 14.00.

Efter ægoplægningen skal du have progesteron via skeden og fortsætte med dette frem til graviditetstesten, som foretages 16 dage efter Ovitrelle-injektionen.

Graviditetstest

Hvis graviditetstesten er positiv, planlægges en graviditetsskanning cirka 3 uger efter svar på blodprøven.

Børn født efter oplægning af fryseæg

Der er indtil nu født flere tusind børn efter nedfrysning efterfulgt af optøning af befrugtede æg. Der er ikke fundet øget hyppighed af misdannelser eller fejl i arveanlæggene.

Succesraten ved oplægning af fryseæg er god. Cirka 95 % af alle nedfrosne æg vil være egnede til oplægning. Ved oplægning af et fryseæg er chancen for en positiv graviditetstest cirka 45 % og for at føde et levende barn cirka 30 % per forsøg.

Kontakt og mere viden

Har I spørgsmål til forløbet eller behandlingen, er I velkomne til at kontakte os.

Hvis I vil vide mere om behandlingen, kan I søge på www.patienthaendbogen.dk. Søg på 'reagensglasbehandling'.



Fertilitetsenheden

Sekretariat

Tlf. 97 66 32 03

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 8.00 – 10.00 og 13.00 – 14.00

Sygeplejerske

Tlf. 97 66 31 86

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 7.30 – 8.30