

Undersøgelse af blodkar i navlesnoren

I navlesnoren er der normalt 3 blodkar:

- 1 blodkar, der bringer blod fra moderkagen ind til fosteret (navlesnorsvene)
- 2 blodkar, der bringer blod fra fosteret tilbage til moderkagen (navlesnorsarterier).

Antallet af blodkar i navlesnoren undersøges rutinemæssigt både ved ultralydsskanning i graviditeten og ved fødslen.

Hos knap 1 % af alle fostre er der kun 2 kar i navlesnoren: 1 vene og 1 arterie. I de fleste tilfælde betyder det ikke noget for fosterets tilstand eller udvikling. I sjældne tilfælde kan det imidlertid være tegn på sygdom. Det kan fx dreje sig om mindre alvorlige misdannelser i nyrer eller hjerte. Hos enkelte kan der være tale om mere alvorlige misdannelser.

I forbindelse med 2. trimesterskanningen i 20. graviditetsuge undersøger vi fosteret grundigt for misdannelser og tegn på sygdom. I de fleste tilfælde er resultatet af denne undersøgelse normalt. Det betyder, at fosteret ikke har øget risiko for misdannelser.

Hvis dit foster har 2 blodkar i navlesnoren, tilbyder vi dig ekstra kontroller med ultralydsundersøgelser, så vi kan vurdere, hvordan fostret vokser.

Sådan foregår undersøgelserne

Ultralydsundersøgelserne foretages af en sygeplejerske, jordemoder eller læge, som også vil besvare alle de spørgsmål, du måtte have.

Undersøgelse i 32. graviditetsuge

De fleste fostre med 2 blodkar i navlesnoren vokser helt normalt. Nogle få vokser mindre end forventet, oftest sidst i graviditeten. Du bliver derfor tilbudt 1 ultralydsundersøgelse i 32. graviditetsuge med henblik på at vurdere fosterets vækst. Hos enkelte kvinder kan der blive tale om flere kontroller.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd

Tlf. 97 66 31 30

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 10.00 – 12.00