

Blæreskylning med Calmette-vaccine

Du er blevet tilbudt en behandling med Calmette-vaccine (BCG). Behandlingen udføres ved, at vaccinen, som er opløst i saltvand, sprøjtes ind i blæren via et tyndt kateter, og behandlingen gentages ugentligt i 6 uger.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Vaccinen består af levende, svækkede tuberkelbakterier. Bakterierne stimulerer kroppens eget celledforsvar i blærevæggen. Behandlingen mindsker og forebygger eventuelle nye forandringer i blæren.

6 behandlinger

Du skal have behandlingen én gang om ugen i 6 uger. Behandlingen foregår ambulant. Den første behandling får du cirka 3 uger efter, du har fået taget vævsprøver fra blæren ved en kikkertundersøgelse eller du har fået fjernet en polyp fra blæren.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Vask dig forned

Det er vigtigt, at du er omhyggelig med at vaske dig forned om morgenen inden blæreskylningen. Er du mand, er det vigtigt, at du trækker forhuden tilbage og skyller området grundigt.

Undlad at drikke

Du bør ikke drikke i en periode på 2 timer før behandlingen og i 2 timer efter behandlingen.

Medbring en urinprøve

Inden behandlingen undersøger vi din urin for bakterier. Derfor skal du tage en morgenurinprøve med. Du kan købe et glas til urinprøven på apoteket. Det er vigtigt, at du opbevarer urinprøven køligt, fx i en plastikpose med isterninger, også under transporten til hospitalet. Hvis du har blærebetændelse med symptomer, er vi nødt til at udsætte behandlingen.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Du får vaccine via et kateter

BCG-vaccinen består af ½ dl saltvand, som lægges op i blæren ved hjælp af et kateter, der bliver ført op gennem urinrøret. Du må tage hjem umiddelbart efter. For at få bedst mulig effekt af behandlingen skal væsken helst blive i blæren i 2 timer. Når de 2 timer er gået, lader du vandet, og blæren bliver tømt for væsken.

Bevæg dig under behandlingen

Mens du har væsken i blæren, skal du helst bevæge dig rundt. Det er for at sikre, at hele blærevæggen bliver behandlet.

BIVIRKNINGER

Luft i urinen

Du kan opleve, at der kan være luft i urinen i forbindelse med den første vandladning efter skylningen. Det skyldes, at der kan være kommet luft ind i blæren, da vi lagde væsken op.

Almindelige bivirkninger

I de første døgn efter behandlingen kan du opleve bivirkninger som:

- svie ved vandladning
- blodig urin
- hyppig vandladning
- influenzalignende symptomer
- kvalme
- almindelig utilpashed.

Hvis du får udtalte gener

Får du mere udtalte gener i længere tid som fx temperaturstigning over 38,5 grader, muskelsmerter eller diarré, skal du kontakte din egen læge eller Lægevagten. Når du kommer til behandlingen, vil vi



drøfte, hvordan du har det, og hvor generet du er af de eventuelle bivirkninger.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Brug kondom under behandlingen

Så længe du får blæreskylningerne, skal I bruge kondom under samleje for ikke at overføre BCG-væske til din partner.

Sid ned på toilettet

Vandladning bør foregå siddende for at hindre sprøjt uden for toilettet.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Hvis du har spørgsmål til behandlingen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Urologisk Ambulatorium

Tlf. 97 66 30 08

Mandag – fredag 8.30 – 12.00

Urologisk Sengeafsnit 10

Tlf. 97 66 33 16

Hele døgnet