

Mitomycinskykning af blæren efter fjernelse af nyre og urinleder

Du har fået tilbudt en blæreskykning med Mitomycin efter operationen, hvor du har fået fjernet nyren og urinlederen. Behandlingen gives for at forebygge eventuelle tumorceller i at sætte sig i blæren.

SÅDAN VIRKER BEHANDLINGEN

Mitomycin er en cellegift, som hæmmer celledeling (cytostatikum). Den har til formål at hindre eventuelle tumorceller fra din urinleder i at sætte sig i blæren.

SÅDAN FOREGÅR BLÆRESKYKLNINGEN

Blæreskykningen bliver foretaget af en sygeplejerske, mens du ligger på en boks.

Mitomycin er en væske, du får lagt op i blæren gennem kateteret, som du har efter operationen. Herefter bliver kateteret fjernet, og du kan tage hjem. Mitomycin-væsken skal blive i blæren i 2 timer for at have bedst mulig effekt. Du skal helst være i aktivitet imens, så væsken bevæger sig rundt i blæren og behandler hele blærevæggen. Mitomycinen virker irriterende på slimhinden i blæren, og du kan derfor have svie i blæren, mens behandlingen står på.

Når de 2 timer er gået, lader du vandet og tømmer på den måde blæren for Mitomycin.

Undgå at drikke før og under behandlingen

Vi anbefaler, at du ikke drikker noget 2 timer før behandlingen og i de 2 timer, behandlingen varer. Hvis du tager vanddrivende medicin, anbefaler vi, at du venter med at tage denne til senere på dagen. Dette er for, at du undgår at lade vandet, imens behandlingen foregår.

BIVIRKNINGER

De hyppigste bivirkninger af blæreskykning er udslæt i håndfladerne og symptomer på blærebetændelse såsom svie ved vandladning og hyppige vandladninger. Hvis symptomerne på blærebetændelse fortsætter i flere dage, skal du kontakte din egen læge og få undersøgt din urin for bakterier.

Det første døgn efter hver blæreskykning kan du have blod i urinen. Det er helt normalt, men fortsætter det i flere dage, skal du kontakte din læge.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Skyl dig med håndbruser

Mitomycin kan virke irriterende på huden. Derfor bør du skylle dig med en håndbruser omkring urinrørsåbningen og vaske hænder grundigt med vand og sæbe, efter du har ladet vandet. Første gang du tisser efter behandlingen, skal du sidde ned på toiletet for at undgå urinstenk, og toiletlåget skal lukkes, når du skyller ud.

Disse forholdsregler gælder kun ved første vandladning efter blæreskykningen. Derefter kræver det kun almindelig god hygiejne, når du lader vandet.

Drik rigeligt efter behandlingen

Efter de 2 timers behandling anbefaler vi, at du drikker rigeligt resten af dagen, så blæren skylles godt igennem.

Brug prævention

Ved samleje anvendes kondom i 6 måneder efter behandlingen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Urologisk Dagafsnit 9

Tlf. 97 66 33 18

Mandag – fredag 08.00 – 18.00

Urologisk Sengeafsnit 10

Tlf. 97 66 33 16

Hele døgnet

Urologisk Ambulatorium

Tlf. 97 66 30 08

Mandag – fredag 8.30 – 12.00