

Sådan lindrer og behandler du symptomer på astmatisk bronkitis hos børn fra 0-5 år

Astmatisk bronkitis er en sygdom i luftvejene, som viser sig ved, at dit barn hoster, hvæser eller har pibende vejtrækning. Astmatisk bronkitis er som regel udløst af en forkølelsesvirus.

Sygdommen er meget almindelig i småbørnsalderen. 2/3 af de børn, der får astmatisk bronkitis, vokser fra sygdommen i løbet af 3-4 års alderen. Mange børn har kun et enkelt tilfælde.



SYMPTOMER PÅ ASTMATISK BRONKITIS

Symptomerne på astmatisk bronkitis kan være:

- hoste – tør eller med slim
- hvæsende, pibende og hurtig vejtrækning
- indtrækninger under/mellem ribbenene og ved halsen
- at barnet er forpustet i forbindelse med leg og bevægelse
- at barnet er mere stille og måske mere trygheds-søgende, end det plejer at være – eller mere uroligt og rastløst
- eventuelt feber
- dårlig appetit og manglende lyst til at drikke.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Når barnet viser tegn på astmatisk bronkitis, skal det have anfaldsmedicin, også kaldet 'blå medicin'. Vi giver barnet medicinen via en spacer (se billedet). På sygehuset kan dit barn dog også få medicinen via et forstøver-system.

Barnet skal have medicinen, så længe der er tegn på astmatisk bronkitis, og medicinen skal trappes ud efter lægens anvisning.

Vi anbefaler, at du maksimalt giver dit barn anfaldsmedicin 8 gange i døgnet, hvis barnet behandles hjemme.

Du behøver ikke at vente 3 timer mellem hver inhalation. Der kan f.eks. være brug for at give 2 – 3 inhalationer med kortere intervaller.

Hvis der er brug for at give mere end 8 inhalationer i døgnet, skal du kontakte en læge.

Husk, at dit barn også kan have brug for medicin om natten, selvom det sover.

Hvis barnet har gentagne anfald af astmatisk bronkitis, kan det blive aktuelt at behandle det med forebyggende medicin.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Som forælder kan du være med til at afhjælpe dit barns symptomer ved at følge disse retningslinjer:

- Dit barn tåler ikke røg fra cigaretter og damp fra E-cigaretter. Passiv rygning forværrer dit barns astmatiske bronkitis, og dit barn bør aldrig opholde sig, hvor der bliver røget.
- Lad dit barn sove med let hævet hovedgærde.
- Lad barnet sove i et køligt og veludluftet rum med en temperatur på cirka 20 grader.
- Luft ud i hjemmet et par gange om dagen af 5-10 minutters varighed. Der skal helst være gennemtræk, når du luffer ud.

- Sørg for, at dit barn føler sig trygt og roligt. Barnet har det ofte bedst, når det er 'på arm'.
- Giv dit barn rigeligt at drikke.
- Begræns os fra eventuel brændeovn, stearinlys med videre.
- Vær opmærksom på stærke dufte/lugte, da de også kan forværre barnets tilstand.

Dit barn kan komme i daginstitution eller dagpleje, når det ikke længere er påvirket af den astmatiske bronkitis.

Søg læge, hvis du er utryg ved barnets sygdom.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Børne- og Ungeafdelingen

Sekretariatet

Tlf. 97 66 33 30

Børneambulatoriet

Tlf. 97 66 34 00

Allergisygeplejerske

Tlf. 97 66 34 02

Hverdage 8.00 – 9.00

Børnemodtagelsen

Tlf. 97 66 34 21

Børne- og Unge dagafsnit

Tlf. 97 66 34 12

Børne- og Unge døgnafsnit, Etage 1

Tlf. 97 66 34 25

Børne- og Unge døgnafsnit, Etage 2

Tlf. 97 66 64 33

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 10.00 – 14.00