

Behandling med Vesicare®

Vesicare® er blæredæmpende medicin, som kan gives til børn og unge med hyppig vandladning og/eller bydende vandladningstrang eventuelt kombineret med urininkontinens, oftest på baggrund af en overaktiv blære. Den overaktive blære får hele tiden mange nerveimpulser, som medfører, at den trækker sig sammen. Hvis blæren kun trækker sig lidt sammen føles det som vandladningstrang. Når blæren trækker sig helt sammen starter vandladningen, og kan næsten ikke standses ved viljens kraft.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Medicinen virker på blæremusklen, så den bliver mindre følsom for de nerveimpulser, der får den til at trække sig sammen. Det betyder, at barnet vil have færre vandladninger per dag, et lidt større blærerumfang og mindre kraftig vandladningstrang.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Vi har lavet en elektronisk recept, og I kan hente medicinen på et hvilket som helst apotek i Danmark.

Følg den behandlingsplan, som er lavet til jeres barn.

Når barnet har taget medicinen i 4-6 uger kan I begynde at vurdere effekten af behandlingen. Virker medicinen efter hensigten skal barnet fortsætte behandlingen i 3-6 måneder. Herefter skal barnet holde pause. Kommer symptomerne tilbage, kan behandlingen genoptages.

BIVIRKNINGER

De fleste børn har ingen bivirkninger af medicinen, men da medicinen ikke kun virker på blæremusklen, men også på andre muskler og organer er der nogle bivirkninger, I skal være opmærksomme på. De almindeligste bivirkninger er mundtørhed, forstoppelse, tørre øjne, svimmelhed og hovedpine.

Hvis medicinen virker alt for godt, er der risiko for resturin. Hvis barnet får denne bivirkning, skal det

holde op med at tage medicinen, og I skal kontakte barnets egen læge eller Lægevagten.

Læs indlægssedlen eller se mere på www.medicin.dk

KONTROL

Barnet vil efter 6-8 ugers behandling blive indkaldt til en blæreskanning. Her skanner vi blæren efter en vandladning for at se, om medicinen giver anledning til dårlig blæretømning. Dårlig blæretømning betyder, at det vil være urin tilbage i blæren efter en vandladning. Er dette er tilfældet, kan barnet være nødt til at stoppe med medicinen, da rest urin øger risikoen for urinvejsinfektion.

Husk at møde med fyldt blære til kontrollen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.



Kontakt

Børneambulatoriet
Videnscenter for urininkontinens
Tlf. 97 66 3400
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 08.00 - 15.00

Mail: borneinkontinens@rn.dk

Børnemodtagelsen
Tlf. 97 66 34 21

Dine aftaler

Startdato:	
Startdosis:	
Dato for kontrol	