

Baklofentest

Nogle børn med spasticitet/muskelstivhed har ikke tilstrækkelig effekt af behandling med tablet/mikstur eller har for mange bivirkninger. I disse tilfælde kan barnet tilbydes behandling med en baklofenpumpe.

En baklofenpumpe er en lille medicinbeholder på 7 cm i diameter og 2 cm i højden. Pumpen giver kontinuerligt medicin tilpasset barnets behov.

Pumpen opereres ind under maveskindet – i højre eller venstre side. Medicinen ledes via et tyndt kateter til rygmarvskanalen. Pumpen styres elektronisk og kan således løbende reguleres efter behov.

Test før anlæggelse af baklofenpumpe

Før vi kan vurdere, om dit barn kan tilbydes en baklofenpumpe, foretager vi en baklofentest. Testen skal vise, om barnet har effekt af at få medicin på denne måde. Ved baklofentesten lægges et tyndt kateter ind i rygmarvskanalen og giver medicin igennem det. Derved kan vi teste, om det har effekt.

Anlæggelse af kateter samt test tager 2-3 dage på hospitalet, hvor barnet skal være indlagt sammen med en forælder.

Anlæggelse af kateter ved operation

Anlæggelsen af kateteret i rygmarvskanalen foregår i fuld bedøvelse. For at sikre, at narkosen ikke påvirker resultatet af testen, begynder vi først test med medicin den efterfølgende dag.

2 timer efter at kateteret er anlagt, må barnet komme op at sidde i stol eller sidde med løftet hovedgærde.

Sådan forbereder du dig

Mød fastende

Dit barn skal faste inden bedøvelsen. Følg disse regler, medmindre du har fået andet at vide af lægen:

- **Indtil 6 timer** før må barnet må spise og drikke normalt.
- **Indtil 4 timer** før må barnet få modermælkserstatning.
- **Indtil 3 timer** før må barnet ammes og få modermælk.
- **Indtil 1 time** før må barnet få klare væsker, fx vand, saftvand og juice uden frugtkød.

Sådan foregår baklofentesten

Dagen efter at kateteret er blevet lagt, laver vi selve testen. Hvis barnet har det godt, må det gerne komme op i sin stol eller anvende sit ganghjælpemiddel under selve testen. Hvert barn reagerer individuelt på testen og kan opleve disse midlertidige bivirkninger:

- meget slappe muskler
- hovedpine
- døsighed
- svimmelhed
- kvalme og opkast.

Når testen er afsluttet og kateteret er fjernet, skal barnet fortsat ligge ned i 24 timer for at undgå midlertidige bivirkninger. Derefter må I tage hjem.

Når I kommer hjem

Lig mest muligt ned det første døgn

De første par dage efter, at barnet er udskrevet, kan de tidligere nævnte bivirkninger opleves. Vi anbefaler, at barnet ligger ned så meget som muligt, og at I eventuelt behandler symptomerne med smertestillende medicin.

Svar på undersøgelsen

Resultat af baklofentest

Afhængigt af testresultatet vil barn, forældre og læge i samråd vurdere, om der er gavn af en baklofenpumpe, og i så fald vil barnet blive indstillet til operation.

Barnet vil modtage en indkaldelse til operation og indlæggelse på Børneafdelingens Døgnafsnit.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Døgnafsnit for Børn og Unge

Tlf. 97 66 34 25

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 10.00 – 12.00