



Undersøgelse af luftvejenes følsomhed med Metacolintest

Metacolintest er en provokationstest, hvor vi undersøger, hvor følsomme dine luftveje er, og om du har astma.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Først får du lavet en lungefunktionsundersøgelse. Derefter inhalerer du et stof, der hedder Metacolin. Derefter får du lavet en lungefunktionsundersøgelse igen, og sådan fortsætter vi testen, indtil du har inhaleret Metacolin 5 gange.

Metacolin gør nogle gange, at luftvejene bliver irriterede. Måske trækker de sig sammen, og du får astmasymptomer som eksempelvis hoste. Det kan føles ubehageligt, men er ikke farligt.

Efter testen får du luftvejsudvidende medicin – såkaldt "blå medicin".

Testen varer cirka 1½ time.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Hold pause med følgende medicin før testen
Medmindre andet er aftalt med din læge, skal du holde pause med følgende medicin før testen:

- **6 uger inden testen** skal du holde pause med Pulmicort, Spirocort®, AeroBec®, Giona, Flixotide®, Bufomix, Relvar®, Seretide®, Symbicort®.
- **72 timer inden testen** skal du holde pause med antihistaminer.
- **48 timer inden testen:** Formo, Oxis®, Serevent®.
- **24 timer inden testen:** Montelukast, Singulair®.
- **8 timer inden testen** skal du holde pause med blå medicin: Ventoline®, Buventol®, Airomir®, Bricanyl®.

Kontakt os, hvis medicinpausen giver dig problemer.

Meld afbud, hvis du føler dig syg

Du skal være rask på undersøgelsesdagen. Du må ikke være forkølet, have feber eller lungebetændelse. Ved sygdom er det vigtigt at du melder afbud.

Undgå følgende på testdagen:

- Koffein (findes i kaffe, te, cola, chokolade)
- Rygning
- Energisk motion.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Du får oftest svar på undersøgelsen samme dag.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Ambulatorium for Børn og Unge
Tlf. 97 66 34 00
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 10.00