



Undersøgelse for penicillinallergi

Jeres barn skal undersøges for penicillinallergi. Penicillinprovokationen laves for at be- eller afkræfte mistanken om penicillinallergi.

Provokationen udføres først, når der foreligger en blodprøve enten taget hos os eller hos barnets egen læge, og hvor blodprøven ikke viser antistoffer mod penicillin.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Jeres barn undersøges først af en læge og så af en sygeplejerske. Specielt huden vil blive grundigt undersøgt.

Provokationen foregår på Dagafsnittet, hvor barnet får penicillin som mikstur eller tabletter i stigende mængde. Barnet provokeres 2-3 gange med minimum ½ times interval.

Hvis barnet får en allergisk reaktion, afbryder vi provokationen og behandler om nødvendigt med medicin.

Barnet skal herefter blive i afsnittet, til reaktionen er aftaget, eller i minimum 2 timer efter reaktionen.

Når barnet har fået sidste dosis, skal I blive i afdelingen i 2 timer, hvor vi fortsætter med at observere barnet for eventuelle reaktioner. Forvent, at provokationen varer i alt 3-4 timer. Barnet må ikke forlade afdelingen under provokationen.

SÅDAN FORBEREDER I JER

Følgende medicin må ikke tages i dage/timer op til provokationen:

- Langtidsvirkende Beta2-agonister i 48 timer (Oxis, Serevent, Formo, Bufomix, Seretide, Relval, Elipta, Innovair eller Symbicort)
- Korttidsvirkende Beta2-agonister i 8 timer: (Ventoline, Airomir, Buventol eller Bricanyl)

- Antihistaminer i 3 døgn.
- Montelukast eller Singulair i 24 timer.
- Tablet Steroid i 4 uger inden provokationen. Hvis jeres barn er i langtids steroidbehandling, kan der undtagelsesvis afviges fra denne regel i samråd med provokationsansvarlige læge.
(Lokal steroidbehandling med creme for eksem skal ikke pauseres).

Kontakt os, hvis jeres barn er sygt

Provokationen kan kun foregå, hvis jeres barn er rask. Barnet må ikke være forkølet, have feber, maveinfluenza, opblussen i eksem eller lignende forud for provokationen. **Har barnet disse symptomer, skal I kontakte afdelingen**

NÅR I KOMMER HJEM

Efter provokationen på Dagafsnittet får I medicin med hjem til langtidsprovokation i 7 dage. Først derefter kan lægen be- eller afkræfte eventuel penicillinallergi.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Du skal kontakte os pr. telefon, hvis dit barn får en allergisk reaktion indenfor de 7 dage, hvor dit barn får langtidsprovokationen.

Har du i øvrigt spørgsmål, eller er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Børne- og Ungeafsnit B
Tlf. 97 66 34 12

Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 10.00 – 14.00

Børneafdelingen
Tlf. 97 66 34 21