

# Behandling af hæmorider - elastikbehandling

Du skal have fjernet hæmorider, og vi har efter undersøgelse vurderet, at dine hæmorider bedst behandles med elastikbehandling.

Hæmorider er udvidelse af blodårerne lige indenfor endetarmsåbningen. Forstoppelse og hård afføring er en hyppig og medvirkende årsag til hæmorider, og når du har hæmorider, kan det bløde i forbindelse med afføring. Senere kan hæmoriderne hænge ud af endetarmsåbningen sammen med slimhinden og give daglige gener som blødning, svie måske smerter, vanskelig hygiejne og påvirket samliv.

## SÅDAN FORBEREDER DU DIG

### Vask dig grundigt før behandlingen

Tag et bad om morgenen eller aftenen før, og vask dig grundigt med vand og sæbe – særligt på stedet for indgrebet.

### Køb smertestillende medicin

Vi anbefaler, at du køber smertestillende håndkøbsmedicin inden operationen, så du har den ved behov i den første tid hjemme.

## SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Ved elastikbehandling afsnøres hæmoriden med en lille elastik, så den "visner" og falder af. Lægen indfører en lille tragt i tarmåbningen og tager fat i hæmoriden med en pincet eller en lille sugeskål. Med et særligt apparat skubbes en udspændt elastik ned over hæmoriden, der herved afsnøres. Hæmoriden mister sin blodforsyning og afstødes i løbet af cirka 1 uge.

Det kan ikke altid undgås, at lidt af huden kommer under elastikken. Det giver smerter, som oftest hurtigt aftager. Nogle føler sig lidt utilpas lige efter behandlingen.

## KOMPLIKATIONER

I sjældne tilfælde kan elastikken glide af for tidligt, og der kan opstå blødning, som er større end en sædvanlig hæmorideblødning.

Ved betydende blødning bør du derfor for en sikkerheds skyld henvende dig til Akutmodtagelsen/Skadeklinikken eller Lægevagten for at få vurderet tilstanden.

I yderst sjældne tilfælde kan der opstå alvorlig infektion ved elastikbehandlingen. Feber, smerter i underlivet, smerter omkring endetarmsåbningen og vandladningsbesvær kan skyldes betændelse udgået fra den afsnørede hæmoride. Får du en eller flere af disse gener, bør du henvende dig til din læge eller ved Lægevagten for at få vurderet tilstanden.

## EFTER BEHANDLINGEN

### Forvent ubehag efter behandlingen

Du kan forvente at have ubehag eller lettere smerter de første dage efter behandlingen. Du kan tage almindelig smertestillende håndkøbsmedicin mod smerterne.

Hvis du får brug for stærkere smertestillende medicin, vil du få den udleveret sammen med en vejledning i, hvordan du skal tage den.

### Hold maven i gang

Du kan opleve at have hård mave på grund af bedøvelsen. Hold maven i gang med fx svesker, sveskejuice, kosttilskud med loppesfrøskaller eller tabletter med magnesiumoxid (fås i håndkøb på apoteket). Husk også at bevæge dig og at drikke 1½ – 2 liter væske dagligt.

### Hvis du oplever tiltagende smerter

Hvis du oplever tiltagende smerter, feber og utilpashed, skal du kontakte din egen læge eller lægevagten.



## KONTROL

Efter cirka 4-6 uger skal du til kontrol i vores ambulatorium, hvor vi foretager undersøgelse af endetarmen.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til operationen, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### **Kirurgisk Dagafsnit Hobro**

Tlf. 97 65 26 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00

#### **Kirurgisk Ambulatorium Hobro**

Tlf. 97 65 20 80

Mandag – fredag 8.00 – 15.00