



Trykmåling i spiserøret (manometri)

Du skal have foretaget en trykmåling i spiserøret. Undersøgelsen kaldes en manometri.

Trykmålingen er en del af din udredning. Vi undersøger, hvordan dit spiserør arbejder.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Sygeplejersken fører en tynd sonde gennem din næse ned i dit spiserør. Sonden er smurt med gel, så den lettere passerer gennem svælget og ned i spiserøret.

Når sonden er på plads, vil du få små mundfulde vand at synke. På den måde kan vi måle, hvordan dit spiserør arbejder. Du får yderligere instrukser på dagen.

Undersøgelsen varer cirka ½ time.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Vær opmærksom på din medicin

Du må tage medicin, som du plejer, med følgende undtagelser:

Hvis du får Motilium®, Emperal®, Primperan® eller Prepulsid, skal du holde pause med medicinen de sidste 3 dage før undersøgelsen.

Mød fastende til aftalen

Du skal faste inden undersøgelsen, så din mavesæk er helt tom. Det er vigtigt for at undgå irritation og opkastning under undersøgelsen. Møder du ikke fastende, kan vi være nødt til at aflyse din aftale. Du skal derfor følge disse retningslinjer:

- Du må ikke spise fra 6 timer inden undersøgelsen. Du må heller ikke drikke mælkeprodukter eller spise pastiller, bolsjer og tyggegummi.
- Du må gerne drikke klare væsker indtil 2 timer før. Det kan fx være vand, saftvand eller te og kaffe uden mælk.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Når undersøgelsen er færdig, vil du få tid til en samtale, hvor vi taler om undersøgelsens resultat og din videre behandling.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Ambulatorium for Mave- og Tarmkirurgi

Tlf. 97 66 11 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00