



# Behandling med loperamid efter operation i endetarmen

Loperamid er et stoppende middel, der anvendes ved løs afføring eller diarré.

Loperamid medvirker til, at fordøjelsen bliver langsommere. Dermed opbevares tarminholdet længere tid i tyktarmen, mere væske opsuges, og afføringen bliver mere formet.

Loperamid findes i præparaterne Imolope, Imodium®, Lopacut, Imolopesin og Imodium® Plus. Imolopesin og Imodium® Plus kan eventuelt også afhjælpe oppustethed og mavekneb.

## SÅDAN GØR DU

### Køb tabletter i håndkøb

Du kan købe tabletter a 2 mg i håndkøb på apoteket. Hvis du har varigt behov, kan der søges tilskud hos Sundhedsstyrelsen.

### Prøv dig frem for at finde rette dosis

Dosis afhænger af, hvor ofte du har afføring og af afføringens konsistens. Dosering af loperamid vil derfor være individuel, og det er nødvendigt, at du prøver dig frem i forhold til tidspunkt og dosis. Start med 1-2 mg. Prøv denne dosis i nogle dage. Ved behov kan du øge dosis med 1-2 mg ad gangen. Du må maksimalt tage 4 mg 4 gange i døgnet.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

**Ambulatorium for Mave- og Tarmkirurgi  
Senfølgeklinikken**  
Tlf. 97 66 07 60  
Vi træffes bedst:  
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag:  
8.00 – 15.00