

Sådan tager du Antepsin® mod endetarmsbetændelse

Du skal i tabletbehandling med Antepsin® (sulcraflat) for endetarmsbetændelse (proktitis). Behandlingen er rektal, hvilket vil sige, at du skal indføre tabletterne i endetarmen.

Du skal tage 2 tabletter Antepsin® a 1 gram 2 gange dagligt i 6 uger.

Medicinen kan indføres i endetarmen på 2 forskellige måder:

1. Tabletterne kan indføres direkte i endetarmen.
2. Tabletterne kan opløses og indføres i endetarmen via et kateter.

Du kan læse mere om de 2 metoder herunder.

SÅDAN GØR DU

Metode 1. Tabletterne indføres direkte i endetarmen

- Smør tabletten med lidt eksplorationsgel eller en anden creme.
- Læg dig på venstre side med benene bøjet op mod brystet – eller stil dig med det ene ben toiletet.
- Indfør tabletten i endetarmen.

Du kan eventuelt bruge engangshandsker eller en eksplorationshætte til fingeren, når du indfører tabletten.

Metode 2. Tabletterne opløses og indføres via et kateter i endetarmen

Følger du metode 2, skal du bruge følgende udstyr:

- 20 ml sprøjte
- Eventuelt en adapter
- 1 kvindekateeter eller lignende
- Bæger med drikkevand
- 2 tabletter a 1 gram.



Her kan du se det udstyr, du skal bruge, hvis du vil indføre tabletten ved hjælp af kateter.

- Træk stemplet ud af sprøjten, og put de 2 tabletter i sprøjten. Sæt herefter stemplet i igen.



- Træk cirka 5 ml vand fra bægeret op i sprøjten. Tabletterne opløses nu til en hvid væske.
- Sæt kateteret på studsens af sprøjten.





- Kom lidt gel eller vand på kateteret.
- Læg dig på venstre side med benene bøjet op mod brystet – eller stil dig med det ene ben på toilettet.
- Før kateteret cirka 5 cm op i endetarmen. Tryk væsken ind i tarmen, og træk kateteret ud igen.
- Herefter må du gerne lægge dig på ryggen. Så fordeles medicinen længere op i endetarmen.
- Kassér kateteret efter brug. Sprøjten kan rengøres og genanvendes afhængig af forureningsgrad, men den skal skiftes dagligt.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til behandlingen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

**Ambulatorium for Mave- og Tarmkirurgi
Aalborg**
Tlf. 97 66 11 00
Mandag – fredag 8.00 – 15.00