



# Behandling med Tarceva

Du skal i behandling med lægemidlet Tarceva, også kaldet Erlotinib. Tarceva er kræftmedicin, der bruges til behandling af patienter med fremskreden kræft i lungerne.

## SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Tarceva virker ved at hæmme aktiviteten af et protein (EGFR), der findes på celleoverfladen i mange kræftceller. Proteinet medvirker til, at kræftcellerne kan vokse ukontrolleret og spredes. Tarceva skal modvirke denne spredning.

## SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Tarceva er en tabletbehandling. Du skal tage 1 tablet dagligt mindst 1 time før eller 2 timer efter indtagelse af mad, eventuelt sammen med et glas vand.

Tabletten tager du derhjemme. Hvis du glemmer at tage Tarceva, skal du springe den glemte dosis over og blot tage lægemidlet igen fra næste dosis. Du må aldrig tage dobbelt dosis.

### Kontrol hos os hver 6. uge

Hver 6. uge skal du til en samtale hos os. I den forbindelse kontrollerer vi dine blodprøver og du får udleveret Tarceva til den næste periode.

Hver 12. uge kontrollerer vi behandlingens effekt med en CT-skanning. Du vil blive indkaldt til skanningen.

Behandlingen fortsætter, så længe sygdommen ikke udvikler sig, og bivirkningerne er acceptable.

## SÅDAN FORBEREDER DU DIG

### Husk at få taget blodprøver før hver kontrol

Du skal have taget en blodprøve før hver kontrol. Vi rekvirerer prøverne elektronisk, men du skal selv bestille tiden på sygehuset.

Bestil tid til blodprøven på [booking.RN.dk](https://booking.rn.dk). Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

## BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Diarré.** Du kan få diarré. Du må maksimalt have 4 vandtynde afføringer per dag. Du kan afhjælpe diarré ved at tage 2 tabletter loperamid ved første diarré, herefter 1 tablet ved hver diarré. Du må maksimalt tage 8 tabletter i døgnet. Hvis der går mere end 24 timer, inden diarréen stopper, skal du kontakte os. Husk at drikke rigeligt med væske, det vil sige cirka 2 liter i døgnet.
- **Udslæt på huden.** En hyppig bivirkning er udslæt, som kan sammenlignes med bumser. Udslættet kan ses allerede efter første behandling og forekommer hyppigt i ansigtet, hovedbunden og nakken samt på armene og ryggen. Hvis du får udslæt, behandler vi det med antibiotika. Du kan med fordel smøre det med en fed, uparfumeret creme. Du må ikke bruge midler mod bumser/acne.
- **Tør hud.** Huden kan blive rød, tør og sviende. Du kan til en vis grad forebygge generne ved at smøre huden med en fed uparfumeret creme allerede fra begyndelsen af behandlingen.
- **Negleforandringer.** Dine neglerødder kan revne, så der opstår betændelse i dem. Sørg for at holde dem rene, og smør dem godt med en fed creme.
- **Lungeirritation (pneumonitis).** Irritation af lungerne forekommer i sjældne tilfælde og mærkes som pludselig åndenød ledsaget af hoste



eller feber. Hvis du får disse symptomer, skal du ringe til os.

## VÆR OPMÆRKSOM PÅ

### Kontakt os ved disse symptomer:

- Diarré, som ikke stopper trods stoppende medicin
- Voldsomt udslæt
- Feber på 38,5 grader eller derover
- Forværring i åndenød
- Svimmelhed og tilfælde af besvimelse
- Blødning.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00