

Anlæggelse af PICC-line-kateter

Du har fået tilbudt at få anlagt et PICC-line-kateter. PICC-line er en tynd slange (et kateter), som anlægges i en blodåre i albuebøjningen eller på overarmen. Kateterets spids kommer til at ligge lige ved hjertets højre forkammer. Kateteret bruges til at indføre medicin i kroppen.

Fordelen ved en PICC-line er, at du slipper for det ubehag, som kan opstå ved gentagne nålestik med kanyler i løbet af din behandlingsperiode.

Når en PICC-line er anlagt, kan den ligge i op til 1 år.

SÅDAN FOREGÅR ANLÆGGELSEN

Du bliver kørt til hospitalets opvågningsstue. Her vil en anæstesisygeplejerske, der er specialuddannet i PICC-line-teknik, anlægge kateteret. Sygeplejersken er iklædt kittel, hue og mundbind under anlæggelsen, så alt er så rent som muligt.

Ved anlæggelsen ligger du ned med armen hvilende på et bord ud til siden. Sygeplejersken ultralydsskanner din overarm for at finde en egnet blodåre.

Din arm bliver pakket ind i sterilt klæde og vasket af med gul sprit. (Den gule sprit kan misfarve tøj, så lad være at tage undertøj på, som du vil være ked af tager farve.)

Dernæst får du lokalbedøvelse i armen. Smerten ved dette svarer til at få taget en blodprøve.

Anlæggelsen af selve PICC-linen varer cirka 30 minutter. Umiddelbart efter anlæggelsen skal du have taget røntgenbillede af din brystkasse for at bekræfte, at kateterets spids ligger det korrekte sted. Først herefter er din PICC-line færdig og klar til din videre behandling.

Alt i alt vil hele proceduren med at få anlagt PICC-line vare cirka 1½ time.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Vær opmærksom på blodfortyndende medicin

Hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin, dog ikke Magnyl®, skal du tage kontakt til afdelingen senest 3 dage før anlæggelsen.

Vask dig grundigt før anlæggelsen

Tag et bad om morgenen, og vask dine arme grundigt med vand og sæbe. Undlad at smøre dig med creme, da det gør desinfektion vanskeligere. Tag rent tøj på. Undlad smykker, piercinger, ur og lignende genstande, der er samlested for bakterier. Så har du gjort det, du kan, for at mindske risikoen for infektion.

NÅR DU KOMMER HJEM

Tag eventuelt smertestillende fra håndkøb

Armen kan reagere på, at PICC-linen er lagt ind i blodåren. Du vil i så fald opleve, at din overarm kan hæve, blive rød og øm. Denne reaktion forekommer oftest i den første uge efter, at PICC-linen er anlagt. Du kan forebygge dette ved at lægge varme eller kulde på eller eventuelt sidde med armen oppe. Prøv dig frem med, hvad der virker for dig. Du må også tage smertestillende håndkøbsmedicin for at dæmpe symptomerne.

Læg is på armen, hvis der opstår blødning

De første dage efter anlæggelsen kan det bløde fra indstiksstedet. Du standser blødningen ved at lægge is på armen. Hvis blødningen er større end en 2-krone, er det nødvendigt at skifte forbindingen.

Tag den med ro i den første tid

Den første uge efter anlæggelsen skal du skåne din arm. Det vil sige, at du ikke skal støvsuge, gå på havearbejde eller lignende. Når armen har vænnet sig til PICC-linen, må du bruge den, som du plejer. Dog anbefaler vi, at du ikke laver hårdt fysisk arbejde og foretager tunge løft.



Beskyt plasteret, før du går i bad

Du må ikke gå i karbad eller svømmehal. Ved brusebad skal indstikssted, adgangsport og tilkoblinger beskyttes mod vand.

Derfor skal du klippe en plastpose til et rør, trække den over kateteret og tape i begge ender. Kontroller efter badet, at plasteret er tørt.

Vær opmærksom på infektion

En PICC-line er et fremmedlegeme i kroppen, hvilket indebærer risiko for infektion. Vær derfor opmærksom på følgende tegn:

- rødme
- varme
- hævelse
- smerter i armen
- ømhed ved indstikssted
- betændelse ved indstikssted
- feber.

Får du nogle af disse symptomer, så kontakt din afdeling. Oftest kan PICC-linen blive liggende trods infektion, men det er nødvendigt med antibiotisk behandling.

JÆVNLIGT SKIFT AF FORBINDING

Som udgangspunkt skal forbindingen skiftes hver 7. dag, hvis den er tør og uden blodgennemstrømning. Det gør hjemmesygeplejersken. Ved skift af forbindingen inspiceres huden og kateteret også. Hvis ikke kateteret anvendes dagligt, vil hjemmesygeplejersken også skylle på det hver 7. dag.

Derudover skal forbindingen skiftes en ekstra gang, hvis der opstår blødning, eller hvis forbindingen bliver våd, snavset eller løsner sig.

Hospitalet udleverer alt, hvad du skal bruge til at skifte forbindingen. Gør opmærksom på, hvis du undervejs i dit behandlingsforløb oplever, at du ikke længere tåler det plaster, PICC-line er sat på med. Vi har flere slags plaster, du kan prøve.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00