

Kemoterapi med Epirubicin

Du skal i behandling med Epirubicin, som er kemoterapi.

sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Epirubicin er et celledræbende stof, som påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have kemoterapi i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 3 uger. Behandlingen foregår ambulant og kræver ikke indlæggelse.

Lægen fortæller dig, hvor mange behandlinger du skal have.

På behandlingsdagen

På behandlingsdagen sker følgende:

- Du bliver vejlet.
- Dernæst får du Epirubicin i en blodåre i drop over 15 minutter.
- Du får kvalmestillende medicin med hjem.

Behandlingen varer i alt cirka 1 time.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus inden klokken 9.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

Bestil tid til blodprøven på [booking.RN.dk](https://booking.rn.dk). Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed**
- **Påvirkning af knoglemarven.** Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, så dit immunforsvar kan blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.
- **Hårtab.** Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Det aftaler vi, inden du begynder på behandlingen. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
- **Irriteret slimhinde i munden.** Slimhinden i munden kan blive rød og irriteret. Du kan forebygge irritation ved at børste tænder jævnligt og lindre generne ved at skylle munden i kamillete.
- **Kvalme og opkastning.** Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin både forebyggende og efter behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
- **Rød urin.** Din urin bliver rød i op til 1 døgn efter hver behandling på grund af farvestof i medicinen.
- **Påvirkning af hjertet.** Behandlingen kan påvirke dit hjertes pumpefunktion. Derfor undersøger vi dit hjerte, før behandlingen begynder og med jævne mellemrum i behandlingsforløbet.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38½ grader eller derover
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder
- Blødning eller tegn på infektion fra slimhinder, fx i tandkødet



AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL
– i gode hænder

- Svimmelhed, træthed og hovedpine.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00