

Behandling med Prednisolon

Du skal i behandling med Prednisolon for at dæmpe dine symptomer. Prednisolon virker fx mod:

- kvalme
- smerter
- appetitløshed
- åndenød.

Sådan virker medicinen

Prednisolon er et kunstigt binyrebarkhormon, som virker dæmpende på symptomer.

Sådan foregår den medicinske behandling

Du skal tage Prednisolon som tabletter. Tabletterne fås i forskellige styrker. Dosis er individuel og afhængig af, hvorfor du skal behandles. Startdosis er sædvanligvis højere end vedligeholdelsesdosis. Når du skal afslutte behandlingen, er det vigtigt, at du gradvist nedsætter dosis. Følg de anvisninger, vi giver dig.

Du skal opbevare Prednisolon ved stuetemperatur.

Bivirkninger

Ved behandling i kort tid

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Indre uro og søvnbesvær.** Det er bedst at tage medicinen om morgenen for at undgå søvnbesvær.
- **Øget appetit**
- **Let øget vægt.** Din vægt kan stige, da der samler sig væske i din krop.
- **Påvirkning af blodsukkeret.** Hvis du er sukkersygepatient, skal du altid huske at kontrollere dit blodsukker.

Ved behandling i længere tid

Hvis du tager Prednisolon i meget lang tid, kan du ud over ovenstående bivirkninger også opleve:

- **Opstemthed eller depression**
- **Måneansigt.** Måneansigt er hævet ansigt på grund af væskeophobning.
- **Forhøjet blodtryk**

- Tynd og tør hud
- Afkalkning af knoglerne
- Risiko for mavesår
- Risiko for sukkersyge.

Tal med en sygeplejerske eller læge, hvis du oplever symptomer på disse gener, så vi kan påbegynde relevant behandling.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

**Onkologisk Afdeling**

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00

Find mere info: <https://aalborguh.RN.dk/onkologi>