



Behandling med Stesolid®

Du skal tage Stesolid® som beroligende middel før din behandling eller undersøgelse. Stesolid® dæmper nervøsitet og angst.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Stesolid® virker beroligende, angstdæmpende og muskelafslappende. Virkningen af Stesolid® forstærkes af alkohol, så du bør ikke drikke alkohol, når du har taget medicinen.

Det virksomme stof i Stesolid® hedder diazepam.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Stesolid® findes som tabletter og som stikpiller til indføring i endetarmen. Vi aftaler, hvilken type Stesolid® du skal tage, og hvilken dosis der er den rette for dig.

Du skal opbevare Stesolid® ved stuetemperatur.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed og døsigheid.** Da medicinen er sløvende, bør du ikke køre bil, når du har taget Stesolid®.
- **Svimmelhed, forvirring og opstemthed.** Mindre hyppigt kan der forekomme svimmelhed og uventede reaktioner i form af forvirring og opstemthed.
- **Afhængighed.** Hvis du tager Stesolid® gennem længere tid, er der risiko for, at du bliver afhængig af medicinen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00